



# キャベツ編



## 病害虫注意報 2023年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### チョウ目害虫対策

この時期、チョウ目害虫の発生が多くなると予想されています。特に高温小雨の時は多発に注意しましょう。



オオタバコガ

・幼虫は体色が黒っぽくまばらに生えた毛が目立つ  
・幼虫は作物に穴をあけて潜り込む性質



シロイチモジヨトウ

・幼虫は体の側面に白い筋が1本通っている  
・幼虫は狭い場所を好み新葉に入る場合もある



ハスモンヨトウ

・成虫は卵塊で(数百個)で産卵する  
・幼虫は背中に1対の黒い斑紋がある  
・食欲旺盛で集団で食害を起こす

### チョウ目害虫おすすめ防除ローテーション

順序	RAC	適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
①	6	コガ・オタバコガ ハスモンヨトウ・ウバ類 等	アニキ乳剤	1000~2000倍	3日前	3回
②	30	コガ・オタバコガ シロイチモジヨトウ 等	グレース乳剤	2000~3000倍 (シロイチモジヨトウ2000倍)	7日前	2回
③	28	シロイチモジヨトウ・ハスモンヨトウ オタバコガ・コガ 等	兼商ヨーバルフロアブル	2500~5000倍	前日	3回
④	13	シロイチモジヨトウ・コガ ハスモンヨトウ・オタバコガ 等	コテツフロアブル	2000倍	前日	2回

### その他おすすめ薬剤

RAC	適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
11A	コガ・アオムシ・オタバコガ シロイチモジヨトウ・ネギアザミウマ ハスモンヨトウ 等	ゼンターリ顆粒水和剤※	1000~2000倍 (オタバコガ・シロイチモジヨトウ・ネギアザミウマ・ハスモンヨトウ1000倍)	発生初期(前日)	-
	ハイマダラノメカ・ネギアザミウマ	フローバックDF	1000倍	発生初期(前日)	-
15	コガ・ヨウムシ・アオムシ ハスモンヨトウ・ハイマダラノメカ	マッチ乳剤	2000~3000倍 (ハスモンヨトウ・ハイマダラノメカ3000倍)	7日前	3回
22B	ハスモンヨトウ・オタバコガ ハイマダラノメカ・ウバ類・コガ アオムシ・キジノミムシ 等	アクセルフロアブル	1000~2000倍 (コガ・キジノミムシ・アオムシ1000倍)	前日	3回
30	シロイチモジヨトウ・コガ ハスモンヨトウ・オタバコガ 等	ブロフレアSC	2000~4000倍	前日	3回


**萎れ・葉焼け予防**

## ファイトカル

10~14日おきに葉面散布

- 優れた展着性・浸透性で、葉先までカルシウムを届ける!!
- 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

※アミスター、無機銅、ホルモン剤液肥類との混用は出来ません



肥料登録 生第83188号

弱った株の回復に!

## カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布!  
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した植物活力資材



肥料登録 生第91402号