



ハクサイ編



病害虫注意報 2023年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫・アブラムシ類・軟腐病の防除

チョウ目害虫



ハスモンヨトウ

多発条件

- ▶ 20～30℃、多湿条件
- ▶ 隣接圃場など外部からの侵入



シロイチモジヨトウ

多発条件

- ▶ 外部からの飛来・侵入
- ▶ 25～30℃
- ▶ 乾燥

アブラムシ類



多発条件

- ▶ 20～25℃
- ▶ 乾燥
- ▶ 隣接圃場など外部からの侵入

被害

- ▶ 葉の萎れ、縮れ、萎凋する
- ▶ ウイルス病の媒介

軟腐病



症状

- ▶ 水浸状の小さな斑点
- ▶ 悪臭、軟化腐敗
- ▶ 細菌による病害

多発条件

- ▶ 激しい降雨
- ▶ 食害・傷が多い圃場

高温少雨が続き、チョウ目害虫やアブラムシ類などが多発します。台風の被害を受けると、病害も感染しやすい状態になるのでご注意ください。

順序	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
①	M01	軟腐病、ナメタジ類等	予 兼商クプロシールド※	1000～1500倍 (ナメタジ類1000倍)	—	—
	5	コガ・ハスモンヨトウ オタバコガ・アムシ等	ディアナSC	2500～5000倍	前日	2回
②	31	軟腐病・黒斑細菌病	予 スターナ水和剤	1000倍	7日前	3回
	30	コガ・ハスモンヨトウ オタバコガ・シロイチモジヨトウ等	ブロフレアSC	2000～4000倍	前日	3回
③	U18	軟腐病・黒斑細菌病	予 バリダシン液剤5	500倍	3日前	3回
	28	アブラムシ類・コガ オタバコガ・シロイチモジヨトウ等	兼商ヨーバルフロアブル	2500～5000倍	前日	3回
④	2	白斑病・黒斑病・菌核病	予 ロブルール水和剤	1000～1500倍 (菌核病1000倍)	14日前	3回
	4A	アブラムシ類・キジノミムシ ダイコンハムシ	アルバリン顆粒水溶剤	2000～3000倍	3日前	2回

※野菜類登録/結球期以降使用不可

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル

10～14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先までカルシウムを届ける!!
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤液肥類との混用は出来ません

肥料登録 生第83188号

弱った株の回復に!

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布!
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した植物活力資材

肥料登録 生第91402号