



イチゴ編



病害虫注意報 2023年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

定植前の防除を徹底し、圃場への病害虫持ち込みを抑えましょう！

育苗～本圃定植時 おすすめローテーション

時期	RAC コード	適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数		
							ミツバチ	マルハナバチ	ミヤコ
9月 ③	1,10	炭疽病・灰色かび病	ニマイバー水和剤	1,000倍	前日	3回	—		21日
	21A	ハダニ類・コナジラミ類 ワアブラムシ 等	サンマイトフロアブル <small>卵(ハダニ類)にも効果あり</small>	1,000～ 1,500倍	3日前	1回	4日	1～4 日	30日
定植 まで	23	ハダニ類・アザミウマ類 コナジラミ類・アブラムシ類	モベントフロアブル	500倍 灌注 (250倍灌注 登録もある)	育苗期後半 ～定植当日	1回	1日	45日	45日
9月 ④	M04	炭疽病・芽枯病 灰色かび病	オーソサイド水和剤80	800倍	14日前	5回	1日	0日	0日
	13	ハダニ類・ハスモンヨトウ ミカンイロアザミウマ シクメンホリガニ	コテツフロアブル <small>卵(ハダニ類)にも効果あり</small>	2,000倍	前日	2回	10日	9日	14日
10月 ①	1,10	炭疽病	ゲッター水和剤	1,000倍	21日前	3回	0日	1日	14日
	21A	ハダニ類 チャノホリガニ	ダニトロンフロアブル	1,000～ 2,000倍 (チャノホリガニ 1,000倍)	前日	1回	1日	1日	14日 14日 以上
10月 ②	7	うどんこ病・灰色かび病 輪斑病	アフエットフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日
	6	ハダニ類・ハスモンヨトウ 等	アフアーム乳剤	2,000倍	前日	2回	2日	2日	7日

★いずれの薬剤も高温時・多湿時の散布は控え、その日のうちにきちんと乾かしましょう！

高温対策に！

効果の持続は約3か月
放出量は2倍

新登場！

すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや
萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10～20本/10a

※手で折り曲げてから
吊るしてください



海藻サンバ

育苗期・生育期:1,000倍

イノチオのバイオスティミュラント！
発根促進、光合成促進におすすめ！

- ▶ コリンによる光合成促進と発根促進
- ▶ 海藻エキスによる発根促進
- ▶ 転流を促進



肥料登録番号
生第101491号