



ハクサイ編

病害虫注意報 2023年10月号




※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

各種病害虫防除特集

白斑病・べと病・アブラムシ類・チョウ目害虫が多発しやすい時期になります。予防的なローテーション散布を行い、発生前からしっかり防除していきましょう。

白斑病



症状

- ▶ 葉の表面に灰褐色の斑点
- ▶ 斑点は拡大し不規則な形となり灰白色や白色になる

多発条件

- ▶ 比較的低温
- ▶ 多湿

べと病



症状

- ▶ 下葉に淡黄色不正形の病斑を形成する。
- ▶ 上葉や莖にも発生する。

多発条件

- ▶ 18℃前後
- ▶ 多湿

今月のおすすめローテーション

対象害虫によって使用の希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
①	7,11	白斑病・べと病・白さび病 黒斑病・尻腐病・菌核病 等	予・治 シグナムWDG	1,500~2,000倍 菌核病、炭疽病、尻腐病 1,500倍	7日前	3回
	30	コガ・ハモンヨウ オタバコガ・シイモシヨウ等	ブフレアSC	2,000~4,000倍	前日	3回
②	40,49	べと病	予 オロンディスウルトラSC	2,000倍	7日前	2回
	6	コガ・ヨウムシ・アムシ	アフーム乳剤	1,000~2,000倍	7日前	3回
③	4,M05	べと病、ピシウム腐敗病 白さび病	予・治 フオリオゴールド※	800~1,000倍 ピシウム腐敗病、白さび病 1,000倍	7日前	2回
	4C	アブラムシ類	トランスフォームフロアブル	2,000倍	3日前	3回
④	7	白斑病・黒斑病 菌核病・尻腐病	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回
	9B	アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍	3日前	3回

※フオリオゴールドはダコニール1000と合わせて2回まで

弱った株の回復に！

茶葉から抽出した植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録 生第91402号



チップバーンなどの予防に！

ファイトカル

1,000倍 10~14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを！！
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤液肥類との混用は出来ません

肥料登録 生第83188号

