



# キュウリ編

## 病害虫注意報 2023年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### 定植前～生育初期の防除

粒剤は一般的に2～3週間効果が持続します。  
アブラムシ類・コナジラミ類・ミナキイロアザミウマはウイルス病を媒介します。  
ウイルスを媒介する害虫を徹底的に防除しましょう！

#### ～定植前センチュウ防除～

- ・育苗・定植時期の気温がセンチュウの生育適温となり密度が高まる。
- ・定植後1か月から急増する。



ネマトセンチュウ

#### ～代表的なウイルス病～



ミナキイロアザミウマ

・黄化えそ病 (MYSV)



アブラムシ類

・キュウリモザイクウイルス (CMV)



コナジラミ類

・黄化病 (BPVY)  
・退緑黄化病 (CCYV)

**センチュウ、ウイルス病は被害が出てしまうと生育中の防除対策はない**  
→定植前の防除が必要

| RACコード | 薬剤名      | 使用量                    | 使用時期       | 使用回数 | アザミウマ類         | コナジラミ類 | アブラムシ類    | その他           |
|--------|----------|------------------------|------------|------|----------------|--------|-----------|---------------|
| 1B     | ネマキック粒剤  | 15～20kg                | 定植前        | 1回   | —              | —      | —         | ○<br>ネマトセンチュウ |
| 4A     | ベストガード粒剤 | 育苗期：1g/株<br>定植時：1～2g/株 | 育苗期<br>定植時 | 1回   | ○(定植時)         | ○      | ○         | —             |
| 4A     | アルバリン粒剤  | 1～2g/株                 | 育苗期<br>定植時 | 1回   | ○(2g/株<br>定植時) | ○      | ○<br>1g/株 | ○<br>ハダニ類     |

### 定植後 おすすめローテーション

対象害虫によって使用の希釈倍数が異なる場合があります。  
ラベルの確認をしてから使用してください。

| 時期 | RACコード     | 対象病害虫                           | 薬剤名                | 希釈倍数                         | 使用時期 | 回数 | 影響日数<br>スルスキー |
|----|------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|------|----|---------------|
| ①  | M03        | つる枯病・斑点細菌病<br>炭疽病・べと病等          | 予 ジマンダイセン水和剤       | 600倍<br>べと病600～800倍          | 前日   | 3回 | 30日           |
|    | 23         | アブラムシ類・コナジラミ類<br>アザミウマ類・ハダニ類    | モベントフロアブル          | 2,000倍                       | 前日   | 3回 | 30日           |
| ②  | 7          | うどんこ病・菌核病・灰色かび病                 | 予 アフェットフロアブル       | 2,000倍                       | 前日   | 3回 | 0日            |
|    | 13         | ミナキイロアザミウマ<br>ミナキイロアザミウマ・ハダニ類 等 | コテツフロアブル           | 2,000倍                       | 前日   | 3回 | 14日           |
| ③  | 11,<br>M05 | べと病・うどんこ病<br>灰色かび病・炭疽病等         | 予・治 アミスターオプティフロアブル | 1,000倍                       | 前日   | 4回 | 0日※           |
|    | 21A        | ハダニ類・コナジラミ類・アブラムシ類              | サンマイルフロアブル         | 1,000～1,500倍                 | 前日   | 2回 | 30日           |
| ④  | 12         | 灰色かび病・菌核病・褐斑病                   | 予 セイビアーフロアブル20     | 1,000～1,500倍<br>褐斑病1,000倍    | 前日   | 3回 | 0日            |
|    | 5          | アザミウマ類・ハダニ類<br>ウリメカガ・コナジラミ類     | ディアナSC             | 2,500～5,000倍<br>コナジラミ類2,500倍 | 前日   | 2回 | —             |

※アミスター20FL単剤は0日

#### 定植3～5日前のおすすめ処方

### ベリマークSC

灌注専用剤

使用薬量25～50ml  
散布水量10～20L  
(400株あたり 灌注処理)



灌注処理に  
プラス!



### ファイトオーツ- 1,000倍

同時灌注で効果アップ  
▶毛細根の充実  
▶徒長防止



肥料登録  
生第83241号

新規適用拡大!

### ダニオーテ フロアブル

ハダニ類 2,000倍  
収穫前日/2回

★ハダニ類の全ステージに活性  
★天敵・有用昆虫への影響が少ない



※銅剤との混用不可 近接散布不可 (3か月)