



# トマト編

## 病害虫注意報 2023年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### マルハナバチ導入後のコナジラミ類防除



黄化葉巻病(TYLCV)



黄化病(ToCV)



タバココナジラミ



オンシツコナジラミ

コナジラミ類は黄化葉巻病や黄化病のウイルスを媒介します。特に黄化病は黄化葉巻病耐病性品種でも感染・発病します。引き続き、徹底したコナジラミ類防除をおすすめします。

### 今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

| 時期   | RACコード  | 対象病害虫   | 薬剤名           | 希釈倍数                                  | 使用時期 | 回数 | 影響日数<br>マルハナバチ |
|------|---------|---|---------------|---------------------------------------|------|----|----------------|
| 10月① | 21A, 16 | コナジラミ類・トマトヒゲダニ                                      | アプロードエースフロアブル | 1,000~2,000倍<br>(トマトヒゲダニ1,000倍)       | 前日   | 3回 | 1日             |
|      | 28      | ハモグリバエ類・オオタバコガ                                      | プレバソンフロアブル5   | 1,000~2,000倍<br>(オオタバコガ2,000倍)        | 前日   | 3回 | 1日             |
| 10月② | 34      | トマトヒゲダニ・アザミウマ類<br>タバココナジラミ類<br>(シルバーリーフコナジラミ含む)     | ファインセーブフロアブル  | 1,000~2,000倍<br>(トマトヒゲダニ1,000~4,000倍) | 前日   | 3回 | 1日             |
|      | M07     | 灰色かび病・葉かび病<br>すすかび病 等                               | ベルコートフロアブル    | 2,000~4,000倍                          | 前日   | 3回 | 0日             |
| 10月③ | 30      | コナジラミ類・トマトヒゲダニ<br>ハモグリバエ類・オオタバコガ<br>ハモンヨトウ・トマトキバガ 等 | グレーシア乳剤       | 2,000倍                                | 前日   | 2回 | 1日             |
| 10月④ | 6       | コナジラミ類・トマトヒゲダニ<br>ハモグリバエ類                           | コロマイト乳剤       | 1,500倍                                | 前日   | 2回 | 1日             |
|      | 7       | 灰色かび病・葉かび病<br>すすかび病 等                               | ネクスターフロアブル    | 1,000倍                                | 前日   | 3回 | 1日             |

**光合成能力UP!**

**ファイトマジック**  
1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム  
+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!  
★根に活力を与える!



肥料登録 生第87201号

**白酢**

**発根を促進!  
根張り向上!**

灌注時: 100~300倍  
散布時: 300~1,000倍



※強酸性のため100倍より濃く希釈しないように注意

**弱った株の回復に!**

**カテキンパワー**  
1,000倍 葉面散布

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録 生第91402号