



ミニトマト編

病害虫注意報 2023年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



今月の 注意点

11月以降はハウスを締め切る時間が長くなり、湿度の高い時間も長くなります。多湿な条件が続くと病害が発生しやすくなるため、定期的に防除を行いましょう！



灰色かび病



発病条件：

気温20℃位の多湿条件下で発生が多くなる。

注意点：

ゴーストスポットと呼ばれる白色円形の白斑点が果実に生ずる。この被害も灰色かび病による影響です。

葉かび病・すすかび病

葉かび病



すすかび病



発病条件：

葉かび病：20～25℃

すすかび病：25～30℃

注意点：

目視での葉かび病・すすかび病の判別は難しい。潜伏期間が約2週間と長く、

無症状=非感染ではない

かいよう病



発病条件：

25～28℃

多湿、特に濡れた傷口がある状態

注意点：

果実の症状が発生するのは、ほとんどが露地栽培のみ。

施設栽培は萎凋症状が主である。

今月のおすすめローテーション

対象病害によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

| 時期 | RAC | 対象病害 | 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 | 影響日数 マルハバチ |
|------|--------|-----------------------|----------------------|------------------|------|----|---------------|
| 11月① | 7,11 | 灰色かび病・すすかび病 葉かび病 等 | 予・治 シグナムWDG | 2,000倍 | 前日 | 2回 | — |
| 11月② | M01 | かいよう病・すすかび病 葉かび病 | 予 兼商クプロシールド | 1,000倍 | — | — | 1日(クロ) |
| 11月③ | 7 | 灰色かび病・すすかび病 葉かび病 等 | 予 アフェットフロアブル | 2,000倍 | 前日 | 3回 | 1日 |
| 11月④ | 11 | 灰色かび病・すすかび病 葉かび病 等 | 予・治 ファンタジスタ 顆粒水和剤 | 2,000～ 3,000倍 | 前日 | 3回 | 1日 |
| 臨機 | 24,M01 | かいよう病・葉かび病 斑点細菌病 等 | 予・治 カッパーシン水和剤 | 1,000倍 | 前日 | 5回 | 0日 |

光合成能力UP!

ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム
+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!
★日照不良時の代謝の向上!



肥料登録
生第87201号

軟弱徒長株を強く!

エレマックス赤

0-28-26

1,000倍 葉面散布

樹を締めて徒長防止!
花芽分化・着果(花)の向上に!

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、
液肥、ホルモン剤との混用は避けてください



肥料登録
輸第9423号

弱った株の回復に!

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録
生第91402号