



トマト編

病害虫注意報 2023年11月号




※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



今月の注意点

11月以降はハウスを締め切る時間が長くなり、湿度の高い時間も長くなります。多湿な条件が続くと病害が発生しやすくなるため、定期的に防除を行いましょう！



灰色かび病



発病条件：

気温20℃位の多湿条件下で発生が多くなる。

注意点：

ゴーストスポットと呼ばれる白色円形の小斑点が果実に生ずる。この被害も灰色かび病による影響です。

葉かび病・すすかび病

葉かび病



すすかび病



発病条件：

葉かび病：20～25℃

すすかび病：25～30℃

注意点：

目視での葉かび病・すすかび病の判別は難しい。潜伏期間が約2週間と長く、

無症状=非感染ではない

かいよう病



発病条件：

25～28℃

多湿、特に濡れた傷口がある状態

注意点：

果実の症状が発生するのは、ほとんどが露地栽培のみ。

施設栽培は萎凋症状が主である。

今月のおすすめローテーション

対象病害によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハバチ
11月①	7,11	灰色かび病・すすかび病 葉かび病 等	予・治 シグナムWDG	2,000倍	前日	2回	—
11月②	M01	かいよう病・すすかび病 葉かび病	予 兼商クプロシールド	1,000倍	—	—	1日(クロ)
11月③	7	灰色かび病・すすかび病 葉かび病 等	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日
11月④	11	灰色かび病・すすかび病 葉かび病 等	予・治 ファンタジスタ 顆粒水和剤	2,000～ 3,000倍	前日	3回	1日
臨機	24,M01	かいよう病・葉かび病 斑点細菌病 等	予・治 カッパーシン水和剤	1,000倍	前日	5回	0日

光合成能力UP!

ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム
+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!
★日照不良時の代謝の向上!



肥料登録
生第87201号

軟弱徒長株を強く!

エレマックス赤

0-28-26

1,000倍 葉面散布

樹を締めて徒長防止!
花芽分化・着果(花)の向上に!

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、
液肥、ホルモン剤との混用は避けてください



肥料登録
輸第9423号

弱った株の回復に!

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録
生第91402号