



イチゴ編

病害虫注意報 2024年1月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春先の病害虫蔓延を防ぐために 定期的な防除を心がけましょう！



収穫中 おすすめローテーション



対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナ	ミカド	刊
1月 ③	11	炭疽病 灰色かび病	予・治 ファンタジスタ 顆粒水和剤	2,000~3,000倍 炭疽病：2,000倍	前日	3回	1日		0日	
	-	うどんこ病・コナジラミ類 ハダニ類・アブラムシ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日		1日	
天敵導入										
2月 ①	7,11	うどんこ病・炭疽病 灰色かび病	予・治 シグナムWDG	2,000倍 灰色かび病： 1,500~2,000倍	前日	2回	0日	-	0日	-
	34	アザミウマ類	ファインセーブ フロアブル	1,000~2,000倍	前日	3回	1日		0日	
2月 ②	9	うどんこ病 灰色かび病	予・治 フルピカフロアブル	2,000~3,000倍	前日	3回	0日		0日	
	15	アザミウマ類	マッチ乳剤	1,000~2,000倍	前日	4回	1日	0日	0日	

根張り改善に!

ファイトメット

100~150g/10aまたは
2,000~3,000倍灌水

根張りが悪くなる冬期・収穫期
新しい根を出すチカラを!!

▶毛細根の充実!

▶リン酸・ミネラル分の吸収UP!



肥料登録
輸第84050号

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル

1,000倍 葉面散布

優れた展着性と浸透性!
グリシンハチン配合!
軟弱果対策にも
おすすめです!

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号

適用拡大情報

カナメフロアブル

4,000倍
収穫前日/4回以内

うどんこ病・灰色かび病
で使用可能!

★浸達性、浸透移行性あり
★優れた予防効果と治療効果

