



# ミニトマト編

## 病害虫注意報 2024年4月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### トマトサビダニ・うどんこ病にご注意ください！



#### 被害

- ▶ 葉の周縁部が黄褐色に裏側へややそり返る
- ▶ 果実は灰褐色に表面が硬化し、細かい亀裂が生じる



#### 症状

▶ 主に葉に発生し、葉表・葉裏に白い菌叢を生じる。

#### 多発条件

- ▶ 20～28℃（表生型）  
18～25℃（内生型）の温度
- ▶ ハウス内の多湿条件で発病しやすい。
- ▶ 乾燥条件では孢子を飛散し、感染拡大しやすい。

#### 多発条件

- ▶ 25℃
- ▶ 乾燥条件

### 今月のおすすめローテーション

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルチバチ
4月①	I:UN F:M10	うどんこ病 トマトサビダニ・コナジラミ類	予 パルミノ	2,000倍	前日	5回	1日 (ク0)
4月②	20D	トマトサビダニ・ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日	1回	1日
	-	うどんこ病・アブラムシ類 コナジラミ類・ハダニ類	フーモン※	1,000倍	前日	-	0日
4月③	7,11	うどんこ病・灰色かび病 すすかび病 等	予・治 シグナムWDG	2,000倍	前日	2回	-
	30	コナジラミ類・トマトサビダニ アザミウマ類 等	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日
4月④	34	トマトサビダニ・アザミウマ類 ハダニコナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	ファインセーブフロアブル	1,000～2,000倍 (トマトサビダニは 1,000～4,000倍)	前日	3回	1日

※野菜類登録

高温対策に！ 効果の持続は約3か月、放出量は2倍

## すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防！  
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ  
10～20本/10a

※手で折り曲げてから  
吊るしてください



萎れ・葉焼け予防に！

## ファイトカル

7～10日おきに葉面散布

▶ 優れた展着性・浸透性で、  
葉先や果実の先までカルシウムを！！

▶ 有機酸とトレハロースによるWキレート  
カルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤  
液肥類等との混用は出来ません



肥料登録  
生第83188号