




ミニトマト編

病害虫注意報 2024年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

天窗・側窓を開放する時間が増えると、コナジラミ類の侵入も増えます。コナジラミ類によって伝搬するウイルス病は、減収に影響します。物理的・化学的防除を組み合わせる栽培終盤も乗り切りましょう。



黄化葉巻病(TYLCV)



新葉が黄化・萎縮し、葉巻症状を呈する。進行すると節間が短くなり株まで萎縮する。重度になると、着果不良になる。

耐病性品種は症状が分かりにくい場合があります。

黄化病(ToCV)



初期は下位葉の葉脈間の黄化が発生し、上位葉へも広がる。葉脈間の症状は、徐々にえぞ症状を伴う。これはマグネシウム欠乏に類似していると言われる。

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

| 時期 | RACコード | 対象病害虫 | 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 | 影響日数 マルハバチ |
|---------|--------|------------------------|----------------------|--------------|------|----|---------------|
| 5月 ① | 11 | 灰色かび病・葉かび病 すすかび病 等 | ファンタジスタ 顆粒水和剤 | 2,000~3,000倍 | 前日 | 3回 | 1日 |
| | 9B | アブラムシ類 コナジラミ類 | チェス 顆粒水和剤 | 5,000倍 | 前日 | 3回 | 0日 |
| 5月 ② | U06,3 | うどんこ病 | パンチョTF 顆粒水和剤 | 2,000倍 | 前日 | 2回 | 0日 |
| | 4A | コナジラミ類・アブラムシ類 | バリアード 顆粒水和剤 | 4,000倍 | 前日 | 3回 | 1日 |
| 5月 ③ | 7 | 灰色かび病 葉かび病・菌核病 | カンタスドライフロアブル | 1,000~1,500倍 | 前日 | 3回 | 0日 |
| | 6 | ミカンキロアザミウマ コナジラミ類 等 | アニキ 乳剤 | 1,000~2,000倍 | 前日 | 3回 | 1日 |

高温対策に！ 効果の持続は約3か月
放出量は2倍

すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10~20本/10a

※手で折り曲げてから
吊るしてください



ダブルシューターSE

1,000倍
前日/2回/マルハバチ3日

ハダニ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類
アザミウマ類・オオハコガ・トマトハガ
コナジラミ類対策におすすめの1剤!!

