



# イチゴ編

病害虫注意報 2024年6月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

切り離し前にしっかり防除を行い、苗床での病害虫発生を少しでも抑えましょう！

## ランナー切り離し前 おすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハチ	ミコ	刊
6月③	炭疽病 <b>予・治</b>	<b>ゲッター水和剤</b>	1,000倍	21日前	3回	0日	1日	<b>14日</b>	
	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミワ類	<b>モベントフロアブル</b>	2,000倍	前日	3回	1日	<b>30日</b>	<b>35日</b>	
6月④	炭疽病 灰色かび病 うどんこ病 等	<b>シグナムWDG</b>	2,000倍 灰色かび病1,500 ~2,000倍	前日	2回	0日	-	0日	-
	アザミワ類 ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ	<b>グレーシア乳剤</b>	2,000倍	前日	2回	1日		<b>100日↑</b>	-
7月①	炭疽病 <b>予</b>	<b>キノドーフロアブル</b>	500~800倍	育苗期	3回	-		-	
	アブラムシ類 シロアゲハアザミワ ハダニ類	<b>アーデント水和剤</b>	1,000倍	前日	4回	2日	3日	<b>60日↑</b>	
7月②	うどんこ病 炭疽病 輪斑病	<b>ベルコートフロアブル</b>	1,000倍	育苗期 (定植前)	5回	0日		0日	
	ワタアブラムシ コナジラミ類 ハダニ類 等	<b>サンマイトフロアブル</b>	1,000~ 1,500倍	3日前	1回	4日	1~4日	<b>30日</b>	

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

展着剤登録あります！

## フーモン

気門封鎖剤を利用して  
他剤の使用回数を抑えましょう！

野菜類登録  
アブラムシ類・ハダニ類  
コナジラミ類・うどんこ病  
1,000倍/収穫前日/回数制限なし  
ミツバチ・マルハナバチ・チリ・ミヤコ0日



※高温注意  
※混用不可薬剤あり

## 海藻サンバ

育苗期・生育期  
1,000倍

特に育苗期の発根促進におすすめ

- ▶ コリンによる**光合成促進**と**発根促進**
- ▶ 海藻エキスによる**発根促進**



肥料登録番号  
生第101491号