



メロン編

病害虫注意報 2025年5月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

アブラムシ類などの害虫、うどんこ病やつる枯病などの病気にも注意しましょう。



今月のおすすめローテーション

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ
①	1	つる枯病・菌核病 陥没病	予・治 トップジンM水和剤	1,500～2,000倍	前日	3回	0日
	9B	コナジラミ類・アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	訪飼不可
②	11	つる枯病・うどんこ病 べと病	予・治 アミスター20フロアブル	2,000倍	前日	4回	0日
	9B	アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5,000倍	3日前	4回	0日
③	7	つる枯病・うどんこ病	予 ケンジャフロアブル	1,500倍	前日	3回	1日
	—	アブラムシ類・コナジラミ類 ハダニ類・うどんこ病	フーモン※	1,000倍	前日	—	0日
④	4, M05	つる枯病・うどんこ病 べと病	予・治 フオリオゴールド	800倍 (べと病: 800～1,000倍)	3日前	3回	—
	23	アブラムシ類・コナジラミ類 アザミウマ類・ハダニ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日

※野菜類登録

コナジラミ類によるすす症状にご注意！



写真はトマトのすす症状

原因：コナジラミ、アブラムシ、カイガラムシなど甘露（排泄物）に寄生するかびが繁殖
症状：果実・下葉などに黒色のかびが発生。外観が汚くなり、果実の品質が低下する。
対策：吸汁害虫（コナジラミ類など）の多発を抑制。

イノチオ
おすすめ
コナジラミ類
対策剤

アグリメック
ダブルシューターSE
ベストガード水溶剤

