



イチゴ編

病害虫注意報 2025年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



苗から本圃への病害虫持ち込みを防ぐためにも
親株床から徹底防除に努めましょう！



親株おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハナ	ミヨ	刊
5月 ③	炭疽病 じゃのめ病	ジマンダイセン水和剤	600倍	仮植栽培期 (76日前)	6回	3日	0日	14日	
	アブラムシ類 ハダニ類	ロディー乳剤	1,000～ 2,000倍	前日	3回	開花中は 使用しない		60日↑	84日
5月 ④	炭疽病	ゲッター水和剤	1,000倍	21日前	3回	0日	1日	14日	
	うどんこ病 ハダニ類 等	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	—	0日		1日	
6月 ①	炭疽病 等	アミスター20 フロアブル	2,000倍	親株育成期	3回	0日	1日	0日	
	ハダニ類 等	トクチオン乳剤	1,000倍	75日前	3回	—	1日	30日	
6月 ②	炭疽病 じゃのめ病	ジマンダイセン水和剤	600倍	仮植栽培期 (76日前)	6回	3日	0日	14日	
	ハダニ類	アグリメック	500～ 1,000倍	親株育成期	2回	14日	7日	7日	

高温対策に！

効果の持続は約3か月
放出量は2倍

すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや
萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10～20本/10a

※手で折り曲げてから
吊るしてください



光合成能力UP!

ファイトオーツ

どぶ漬け 1,000倍
葉面散布1,000倍 7～10日おき散布
植物本来の力を活性化☆

▶活着の改善 ▶抵抗性誘導物質の向上
▶毛細根の充実



肥料登録
生第83241号