



スイートコーン編

病害虫注意報 2025年5月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目（オオタバコガ、アワノメイガなど）やアブラムシ類に加えて、カメムシの発生が増加しています。

発生前から予防的に防除し、茎葉や収穫部位への侵入、子実への加害を防ぎましょう。



オオタバコガ



アワノメイガ

Myself (User: Kembangraps), CC BY-SA 3.0
<<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, ウィキメディア・コモンズ経由で



アブラムシ類



ツヤアオカメムシ

おすすめ防除農薬一覧

RAC	薬剤名	ヤングコーン登録（野菜類）		未成熟とうもろこし登録（とうもろこし）	
		対象病害虫	希釈倍数	対象病害虫	希釈倍数
3A	トレボン乳剤	—	—	アワノメイガ・アヨトリ ツマジロクサヨトウ	1,000倍
4A	アルバリン顆粒水溶剤	—	—	アブラムシ類・カメムシ類	2,000倍
4A	モスピラン顆粒水溶剤	アブラムシ類	2,000倍	アブラムシ類	2,000～4,000倍
4C	トランスフォームフロアブル	—	—	アブラムシ類	2,000倍
5	ディアナSC	—	—	アワノメイガ・オオタバコガ	2,500～5,000倍
6	アフーム乳剤	オオタバコガ・ヨトウムシ	1,000～2,000倍	オオタバコガ・ヨトウムシ ツマジロクサヨトウ	1,000～2,000倍
13	コテツフロアブル	ハダニ類・オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	2,000倍	ハダニ類・オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	2,000倍
28	兼商ヨーバルフロアブル	—	—	アワノメイガ・オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	5,000倍
29	ウララDF	アブラムシ類	2,000～4,000倍	アブラムシ類	2,000～4,000倍
30	グレースシア乳剤	ハダニ類	2,000～3,000倍	ハダニ類	2,000～3,000倍
30	プロフレアSC	—	—	ツマジロクサヨトウ・アワノメイガ	2,000～4,000倍

ブルーシアフロアブル

一年生イネ科・広葉雑草に優れた効果！

一年生雑草

とうもろこし3～5葉期(45日前)
1回 40～50ml/100L/10a
雑草茎葉散布または全面散布



※ヤングコーンを出荷する場合は使用不可
※他にも使用時期が異なる登録がありますので、
ラベルをご確認ください。

プロフレア^{SC}

2024年9月

未成熟とうもろこし適応拡大

- ・新規の作用性(IRAC : 30)
- ・散布後数時間で効果発現、雨に強い

アワノメイガ、ツマジロクサヨトウ
2,000～4,000倍/前日/3回

