スイカ編

病害虫注意報 2025年5月号

inochio GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

つる枯病、アブラムシ類、コナジラミ類の発生にご注意ください！

おすすめ防除ローテーション

交配後2週間は農薬散布を避けましょう!

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ
①	M03	つる枯病・べと病 炭疽病　等	予 ジマンダイセン水和剤	400～600倍	7日前	7回	3日
	23	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類・ﾊﾀﾞﾆ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日
②	3	つる枯病・炭疽病 うどんこ病	予・治 スコア顆粒水和剤	2,000倍	前日	3回	1日
	4A	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｺﾅｼﾞﾗﾐ類　等	モスピラン顆粒水溶剤	2,000～4,000倍 (ｺﾅｼﾞﾗﾐ類：2,000倍)	3日前	3回	1日
③	11	つる枯病・炭疽病 菌核病	予 スクレアフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日
	4C	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ｺﾅｼﾞﾗﾐ類	トランスフォームフロアブル	1,000～2,000倍 (ｱﾌﾞﾗﾑｼ類：2,000倍)	前日	3回	10日
④	M07	つる枯病・炭疽病 うどんこ病・菌核病	予 ベルクート水和剤	1,000倍	前日	4回	0日
	29	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	ウララDF	2,000～4,000倍	前日	2回	0日

その他病害虫　おすすめ薬剤

対象病害虫	RAC	薬剤名	希釈倍数	時期	回数	影響日数 ミツバチ
ﾊﾀﾞﾆ類	6	アグリメック	500～1,000倍	前日	3回	**14日**
	20B	カネマイトフロアブル	1,000～1,500倍	前日	1回	1日
	25A	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日	1回	1日
果実汚斑細菌病	24,M01	予・治 カッパーシン水和剤	1,000倍	前日	5回	0日
うどんこ病	3,U06	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日
	7,11	予・治 シグナムWDG	1,500～2,000倍	前日	3回	0日

カテキンパワーUP

「カテキンパワー」がパワーアップしてリニューアル!!

成分などの見直しで、**抗菌力・使いやすさ・コスパがUP!!**

成分：カテキン類　野菜類使用例：500倍　1～2週間ごとに葉面散布
内容量：1リットル　肥効：樹勢回復、活着促進、生育増進

Point!

- 茶抽出物の選抜で抗菌力が向上
- 水に溶けやすくなり、散布しやすい
- 原材料などの見直しで値下げを実現