



イチゴ編

病害虫注意報 2025年6月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

切り離し前にしっかり防除を行い、苗床での病害虫発生を少しでも抑えましょう！

ランナー切り離し前 おすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
						ミバチ	マルハチ	ミコ	刊
6月 ③	炭疽病	予・治 ゲッター水和剤	1,000倍	21日前	3回	0日	1日	14日	
	アブラムシ類・コナジラミ類 アザミウマ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日	30日	35日	
6月 ④	炭疽病・灰色かび病 うどんこ病	予・治 シグナムWDG	2,000倍 (灰色かび病: 1,500~2,000倍)	前日	2回	0日	—	0日	—
	アザミウマ類・ハダニ類 オオタバコガ・ハスモンヨトウ	グレース乳剤	2,000倍	前日	2回	1日		100日 ↑	—
7月 ①	炭疽病	予 キノンドーフロアブル	500~800倍	育苗期	3回	—	—	—	
	アブラムシ類・ハダニ類 ミナキイロアザミウマ	アーデント水和剤	1,000倍	前日	4回	2日	3日	60日↑	
7月 ②	うどんこ病 炭疽病・輪斑病	予 ベルクートフロアブル	1,000倍	育苗期 (定植前)	5回	0日		0日	
	ワタアブラムシ・コナジラミ類 ハダニ類 等	サンマイトフロアブル	1,000~ 1,500倍	3日前	1回	4日	1~4日	30日	
ランナー切り離し									
7月 ③	炭疽病 等	予・治 ファンタジスタ 顆粒水和剤	2,000倍	前日	3回	0日		0日	
	ハダニ類・ ハスモンヨトウ 等	コテツフロアブル	2,000倍	前日	2回	10日	9日	14日	
7月 ④	炭疽病	予 アントラコール 顆粒水和剤	500倍	仮植 栽培期	6回	—	1日	—	7日
	ハダニ類・アブラムシ類 うどんこ病 等	フーモン	1,000倍	前日	—	0日	0日	1日	

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

展着剤登録あります！

フーモン

気門封鎖剤を利用して
他剤の使用回数を抑えましょう！

野菜類登録

アブラムシ類・ハダニ類
コナジラミ類・うどんこ病

1,000倍/収穫前日/回数制限なし
ミツバチ・マルハナバチ・チリ・ミヤコ0日



※高温注意
※混用不可薬剤あり

海藻サンバ

育苗期・生育期

1,000倍

特に育苗期の発根促進におすすめ

- ▶ コリンによる光合成促進と発根促進
- ▶ 海藻エキスによる発根促進



肥料登録番号
生第101491号