



イノチオ防除チラシ
2025年8月号

ブロッコリー カリフラワー

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

育苗期～定植時おすすめ防除

ミネクトデュオ粒剤

害虫対策

細菌病対策

オリゼメート粒剤



28,4A
コナガ・アブラムシ類・アオムシ※ アザミウマ類※・ハイマダラノメイガ※ (※カリフラワー登録なし)
セルトレイ1箱あたり40g
散布
ブロッコリー：は種覆土後～育苗期後半 カリフラワー：育苗期後半
1回

IRAC

対象
病害虫

使用量

使用方法

使用時期

使用回数

P02
ブロッコリー：黒腐病 カリフラワー：軟腐病
6～9kg/10a
全面土壌混和
定植時
1回



ミネクトデュオ粒剤を使用した場合、下記の薬剤は苗場での使用ができません!!
ベリマークSC・ベネビアOD・アクタラ粒剤5・ジュリボフロアブル・プリロッソ粒剤オメガ・アベイル粒剤・アクタラ顆粒水溶剤

IRAC	登録	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用 時期	回数
4E	はなやさい類	コナガ・ハイマダラノメイガ・ヨウムシ ハスモンヨウ・シロイモジヨウ・アオムシ	フィールドマストフロアブル	4,000倍	3日前	2回
5	ブロッコリー カリフラワー	ウリバ類・コナガ・アザミウマ類・ハイマダラノメイガ・アオムシ オオタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨウ・シロイモジヨウ コナガ・アザミウマ類・ハイマダラノメイガ ヨウムシ・ハスモンヨウ・アオムシ	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回
13	ブロッコリー カリフラワー	コナガ・ヨウムシ・ハスモンヨウ・シロイモジヨウ・アオムシ コナガ	コテツフロアブル	2,000倍	3日前	2回
30	はなやさい類	ウリバ類・コナガ・アザミウマ類・ハイマダラノメイガ・アオムシ ヨウムシ・ハスモンヨウ・シロイモジヨウ・オオタバコガ	グレーシア乳剤	2,000～3,000倍	7日	2回
UN	ブロッコリー カリフラワー	コナガ・ハスモンヨウ・シロイモジヨウ コナガ・ヨウムシ・ハスモンヨウ	プレオフロアブル	1,000倍	7日前 3日前	2回

作物によって対象病害虫や希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

苗の徒長対策におすすめ！



このような症状には注意！

- ・植物の元気がない
- ・葉色が薄い
- ・葉と葉の間隔が長い
- ・自力で立てない



エレマックス赤 0-28-26

軟弱徒長株を強く！ 1,000倍 葉面散布

- ▶ 樹を締めて徒長防止！
- ▶ 病害抵抗力の向上に！

肥料登録：
輪第9423号

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避ける。
※カテキンパワーとの混用は可能です



マグマSi

吸収性の高い水溶性ケイ酸資材

- ▶ 細胞壁の強化 (葉面散布)
育苗期2,000 (春夏)
成長期5,000～10,000倍
- ▶ 高温・低温への抵抗性 (灌水)
原液100～200ml / 反
倍率コントロール 20,000～50,000倍
- ▶ 耐病性の向上
- ▶ 成長促進・抑制のコントロール



フルボディ

定植ストレスを軽減・活着促進！

- ▶ 腐植酸(フルボ酸・フミン酸)
→土壌の団粒化 1000～2000倍
- ▶ 海藻抽出成分 500ml/セルトレイ 灌水
→根の伸長促進 定植前