



イノチオ防除チラシ
2025年8月号

キャベツ

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ナメクジ対策 おすすめ薬剤



ナメクジ

新芽や若葉など柔らかい葉を舐めるように食害する。食害痕は果実や葉に穴が開き、ヨトウムシと似ているが、ナメクジの場合、糞や筋状の粘液が付着している。傷口から病害感染を助長する。

発生時期	春・秋(年間1~2世代) 4~6月に産卵、40日ほどで孵化し、秋までに成体になる ※種類によって異なる
生育適温	15~30℃ それ以上の高温は徐々に死亡する 低温には強く、0~10℃以下でもすぐには死亡しない
被害作物	キャベツ・ハクサイ・ブロッコリー・トマト・ピーマン・ナス・セルリーなど カンキツの果実の傷は大きくなると目立つ



ナメクリーン3

ナメクジ類・カタツムリ類を誘引し、
摂食させて効果を発揮するベイト剤

カタツムリ類・ナメクジ類
1~3kg/10a 株元散布 収穫14日前まで / 2回



スラゴ

幅広い農作物や有機農産物栽培でも使用可!

カタツムリ類・ナメクジ類: 1~5g/m²
アフリカマイマイ: 3~5g/m² ヒメリンゴマイマイ: 5g/m²
発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置
発生時 / 一回

チョウ目害虫に注意!

気温が上昇するとチョウ目害虫の発生が増加します。
大量発生し、被害が拡大する前に定期的な防除を心掛けましょう!

シロイチモジヨトウ



ハスモンヨトウ



オオタバコガ



IRAC	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
4E	コガ・カブラハバチ類・アムシ・ハスモンヨトウ ハマダラメカイ・シロイチモジヨトウ 等	フィールドマストフロアブル	4,000倍	前日	2回
13	コガ・オタバコガ・ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ・アムシ 等	コテツフロアブル	2,000倍	前日	2回
28	アブラムシ類・コガ・アザミウマ類 ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ・ウバ 類 等	兼商ヨーバルフロアブル	2,500~5,000倍	前日	3回
30	コガ・アザミウマ類・オタバコガ ウバ 類・ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ 等	グレーシア乳剤	2,000~3,000倍	7日前	2回

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

徒長対策におすすめ!



このような症状には注意!

- ・植物の元気がない
- ・葉色が薄い
- ・葉と葉の間隔が長い
- ・自力で立てない



エレマックス赤 0-28-26

軟弱徒長株を強く! 1,000倍 葉面散布

- ▶ 樹を締めて徒長防止!
- ▶ 病害抵抗力の向上に!

肥料登録:
輸第9423号

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避ける。
※カテキンパワーとの混用は可能です



マグマSi

吸収性の高い水溶性ケイ酸資材

- ▶ 細胞壁の強化
 - ▶ 高温・低温への抵抗性
 - ▶ 耐病性の向上
 - ▶ 成長促進・抑制のコントロール
- 〈葉面散布〉
育苗期2,000 (春夏)
成長期5,000~10,000倍
〈灌水〉
原液100~200ml / 反
倍率コントロール 20,000~50,000倍



フルボディ

定植ストレスを軽減・活着促進!

- ▶ 腐植酸(フルボ酸・フミン酸)
→ 土壌の団粒化 1000~2000倍
- ▶ 海藻抽出成分 500ml/セルトレイ 灌注
→ 根の伸長促進 定植前