



イノチオ防除チラシ
2025年8月号

スイカ

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

栽培終了時の残渣処理特集

コナジラミを減らすために

①有効薬剤を散布し、栽培終了時に虫を死滅させましょう

トンネル外に出た害虫は、露地で繁殖し、再び次作で飛来・侵入します！
次作のための防除をしっかりと行いましょう！



コナジラミ類の成長スピード

気温	15℃	20℃	25℃	30℃
卵～成虫	88日	36日	23日	21日

温度上昇に伴って
一世代のサイクルが速くなります！
大量発生を防ぐためにも
栽培終了後、速やかな防除を
おすすめします！

栽培終了時散布おすすめ薬剤

モベントフロアブル 2,000倍 前日/3回

+ ベストガード水溶剤 1,000～2,000倍 7日前/3回

②雑草はコナジラミ類の発生源となります。

圃場周辺の除草を心掛け、外の雑草からの飛び込みのリスクを減らしましょう！



前作に病気や雑草でお困りの方は土壌消毒が有効です！

👉 効果を上げるポイント！

①砕土を丁寧に行う

→固まっている土の内部は消毒されません！

②被覆を必ず行う

→被覆を行わないと薬剤が抜けやすくなり、
表層しか消毒できません！

バスアミド®

微粒剤

白絹病・つる割病
苗立枯病(リゾクニア菌)
一年生雑草

詳しい登録内容は
お問い合わせください!!



五右衛門

10～20kg/10a 10kg/袋



- ◎ 有機物中の難分解繊維質の分解を促進
- ◎ 有機物中の作物生育阻害物質の分解を促進
- ◎ 有機物施用による有毒ガスの発生を防止
- ◎ 有用微生物が多く存在する豊かな土壌に
直播栽培の圃場ではすきこみから3週間以上あけてください。
ポカシ肥料との併用がより効果的です。

液体微生物資材

ビートルパワー® ファーマー

- ・ 難分解有機物の発酵分解促進
- ・ 微生物相の改善

使用方法

散布または灌注 5L/10a

は種・定植前が効果的

収穫後の残渣処理にも！

