



イノチオ防除チラシ
2025年9月号

ブロッコリー カリフラワー

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫に注意！

ハスモンヨトウ

頭部のやや後方に1対の黒斑がある。卵は50～200個程の卵塊で、黄土色の鱗毛に覆われている。集団で食害し、葉の表皮を残して白色のカスリ状に食害する。老齢幼虫では葉脈を残して暴食し、被害が大きい。

シロイチモジヨトウ

幼虫は体の側面に、白い筋が1本通っている。卵は作物に卵塊で産み付けられ、灰褐色の鱗毛に覆われている。幼虫の体色は若齢期は黄緑色だが、中齢期以降は淡緑色～黒褐色と様々に変異に富む。広食性で50種以上の植物を加害する。

IRAC	登録	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
6	ブロッコリー	コナガ・オタバコガ・ヨウムシ ハスモンヨトウ・アオムシ	アファーム乳剤	1,000～2,000倍 (ハスモンヨトウ: 2,000倍)	3日前	3回
	カリフラワー	コナガ・アザミワタ類 オタバコガ・アオムシ		1,000～2,000倍		
11A	野菜類 (キャベツ、 はくさいを除く)	コナガ・オタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ・アオムシ	ゼンターリ顆粒水和剤	1,000～2,000倍 (オタバコガ・ハスモンヨトウ・ シロイチモジヨトウ: 1,000倍)	発生初期 (前日)	—
	野菜類	コナガ・オタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ・アオムシ	フローバックDF	1,000～2,000倍 (オタバコガ・ヨウムシ・ ハスモンヨトウ: 1,000倍)	発生初期 (前日)	—
13	ブロッコリー	コナガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ・アオムシ	コテツフロアブル	2,000倍	3日前	2回
	カリフラワー	コナガ				
30	はなやさい類	ウリバ類・コナガ・ハママダラノメカ オタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ・アオムシ	ブロフレアSC	2,000～4,000倍	前日	3回
	はなやさい類	ウリバ類・コナガ・アザミワタ類・オタバコガ ハママダラノメカ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ・アオムシ	グレーシア乳剤	2,000～3,000倍	7日前	2回

作物によって対象病害虫や希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

クロスバリュー

2種類の微生物の力で

- 環境ストレスへの耐性強化
- 収量や品質の安定化

野菜類使用例

500～1,000倍、50～100ml/株
定植時～定植後、株元灌注



高温対策専用バイオスティミュラント

炎天マスター

高温ストレスに遭遇する前に処理すると…
→高温耐性のスイッチON!

- ◎HSF遺伝子の発現量増加
(高温に備える指令を伝える遺伝子)
- ◎活性酸素種(ROS)の除去
(ストレスを感じると増加し植物を傷つける物質)

500～1,000倍 7～14日間隔 葉面散布

