



イノチオ防除チラシ  
2025年9月号

# キク

inochio  
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 白さび病の発生が増加する前に対策を!



この症状はどんな病気? ~白さび病~


### 【白さび病(*Puccinia horiana*)】

葉に直径1mmの乳白色の小点が形成され、黄色味を帯びながら2~5mm程度まで大きくなり、**葉裏に淡黄色~淡褐色、イボ状の隆起**が生じる(冬胞子堆)。葉表面の病斑は**円形、淡黄緑色~黄色**。乳白色の小点から冬胞子堆の形成までは、適温下(15~23℃)で数日。

| 冬  |    |    | 春  |    |    | 夏  |    |    | 秋   |     |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |



葉表



葉裏



葉裏

| 時期   | IRAC<br>FRAC | 対象病害虫                         | 薬剤名                   | 予防 | 治療 | 使用量・希釈倍数                            | 使用時期        | 回数 |
|------|--------------|-------------------------------|-----------------------|----|----|-------------------------------------|-------------|----|
| 定植時  | P2           | 白さび病                          | inochioキクツチャ粒剤        | ○  | —  | 6~9kg/10a<br>(作条土壌混和)               | 定植時         | 1回 |
| 生育初期 | M03          | 白さび病                          | ジマンダイセンフロアブル          | ○  | —  | 500~800倍                            | —           | 8回 |
|      | 34           | アザミウマ類                        | ファインセーブフロアブル          | —  | —  | 2,000倍                              | 発生初期        | 2回 |
| 消灯時  | 21A,<br>39   | アブラムシ類・アザミウマ類<br>ハモグリバエ類・白さび病 | ハチハチ乳剤                | ○  | —  | 1,000倍                              | 発生・発病<br>初期 | 4回 |
|      | 23           | アザミウマ類・アブラムシ類<br>ハダニ類         | inochio<br>セイレーンフロアブル | —  | —  | 2,000倍                              | 発生初期        | 3回 |
| 発蕾時  | 7            | 白さび病                          | カナメフロアブル              | ○  | ○  | 4,000~8,000倍                        | 発病初期        | 3回 |
|      | 5            | アザミウマ類・ハモグリバエ類<br>オオタバコガ      | スピノエース顆粒水和剤           | —  | —  | 5,000倍<br>(オオタバコガ:2,500~<br>5,000倍) | 発生初期        | 2回 |
| 破蕾期  | 19           | 白さび病                          | ポリオキシシンAL水溶剤          | ○  | ○  | 2,500倍                              | 発病初期        | 8回 |
|      | 20B          | ハダニ類                          | カネマイトフロアブル            | —  | —  | 1,000~1,500倍                        | —           | 1回 |



地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては被害が発生する  
場合があるためご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。

## カテキンパワーUP

「カテキンパワー」がリニューアル!!

成分などの見直しで、  
**抗菌力・使いやすさがUP!!**

成分: カテキン類 内容量: 1リットル  
野菜類使用例 500倍 葉面散布 樹勢回復



● 高温対策専用 バイオスティミュラント

## 炎天マスター



高温ストレスに遭遇する前に処理すると…  
→ **高温耐性のスイッチON!**

- ◎ HSF遺伝子の発現量増加  
(高温に備える指令を伝える遺伝子)
- ◎ 活性酸素種(ROS)の除去  
(ストレスを感じると増加し植物を傷つける物質)

**500~1,000倍 7~14日間隔 葉面散布**

