



イノチオ防除チラシ
2025年9月号

ミニトマト

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ウイルス病に注意！



この症状はどんな病気？～黄化葉巻病・黄化病～

【黄化葉巻病(Tomato yellow leaf curl virus(TYLCV))】



上位葉の葉縁や葉脈間の黄化と葉巻、萎縮、小葉化などが見られる。症状の発生した部位から上の莖葉は黄化し、生育が抑制される。発病株では、早期に落花する。

タバココナジラミによって媒介される。

※近年、抵抗性品種では典型的な症状が見られないこともあるので注意！

【黄化病(Tomato chlorosis virus (ToCV))】



下位葉～中位葉で葉脈間が退緑黄化する。葉脈に沿った部分を残して黄色、紫色に変色する。えそ斑となる場合もある。発病株は生育が抑制される。

マグネシウム欠乏症に似ているため、判別が難しい。タバココナジラミ及びオンシツコナジラミによって媒介される。

どちらの対策も

コナジラミ類防除が基本です！



タバココナジラミ オンシツコナジラミ



イノチオHDでは農作物の病害虫診断を行っております！

顕微鏡や検査キットを用いて、原因となる病原菌や虫、ウイルスを検査します。

速く・正確な診断で、適した農薬や対策をご提案いたします。

見分けが難しいものや、早急な対応が必要な病害虫も多く存在します。

間違った防除を行い、被害を広げてしまう前に、一度診断をしてみたいはいかがでしょうか？

詳細は各担当営業に
お問い合わせください！



IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数	
						ミツハチ	マルハナ
28	ハモグリバエ類・オオハコガ・ハモシトリ コナジラミ類・アザミヤカ類・トマトハガ 等	兼商ヨーバルフロアブル	2,500～5,000倍 (コナジラミ類・アザミヤカ類・トマトハガ ：2,500倍)	前日	3回	14日	14日 (加)
21A	トマトヒゲダニ・オオコナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	ダニトロンフロアブル	1,000倍 (オオコナジラミ類：1,000～2,000倍)	14日前	3回	1日	
6	トマトヒゲダニ・ハモグリバエ類 オオハコガ・トマトハガ・コナジラミ類	アフーム乳剤	2,000倍	前日	5回	2日	
15	コナジラミ類・トマトヒゲダニ・アザミヤカ類	マッチ乳剤	2,000倍	前日	2回	1日	0日
4A	コナジラミ類・カメムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	2,000～3,000倍 (カメムシ類：2,000倍)	前日	2回	14日 (加22日)	
UN M10	コナジラミ類・トマトヒゲダニ・うどんこ病	パルミノ	2,000倍	前日	5回	5日	1日 (加)
4C	アブラムシ類・コナジラミ類・トマトヒゲダニ	トランスフォームフロアブル	1,000～2,000倍 (アブラムシ類：2,000倍)	前日	2回	10日	2～5 日
5	コナジラミ類・アザミヤカ類・ハダニ類 ハモグリバエ類・オオハコガ・トマトハガ	ダブルシューターSE	1,000倍	前日	2回	2日	3日

作物によって対象病害虫や希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

● 高温対策専用バイオスティミュラント

炎天マスター



高温ストレスに遭遇する前に処理すると…

→高温耐性のスイッチON！

◎ HSF遺伝子の発現量増加
(高温に備える指令を伝える遺伝子)

500～1,000倍

7～14日間隔

◎ 活性酸素種(ROS)の除去
(ストレスを感じると増加し植物を傷つける物質)

葉面散布

クロスバリュー

2種類の微生物の力で

- 環境ストレスへの耐性強化
- 収量や品質の安定化

野菜類使用例

500～1,000倍、50～100ml/株
定植時～定植後、株元灌注

