



イノチオ防除チラシ
2025年9月号

イチゴ

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



高温時対策 おすすめ資材



海のカラを植物へ。 マリンインパクト

海藻抽出物100%使用

- ◆成り疲れ対策にも効果抜群!
 - ◆菌根菌との共生アップ
 - ◆長期取り作物のストレス対策に
- 500~1,000倍
〈定植直後〉2週間おき2~3回
〈着果・果実充実〉2週間おき2~4回



高温ストレス軽減 炎天マスター

高温耐性のスイッチON!

- ◆高温対策専用バイオスティミュラント剤
 - ◆高温に備える指令を伝える遺伝子の発現増加
 - ◆ストレスによって植物を傷つける物質の除去
- 500~1,000倍
7~14日間隔 葉面散布



広がる根、実る価値。 クロスバリュー

2種類の微生物で根を活性化!

- ◆環境ストレスへの耐性強化
 - ◆収量や品質の安定化
- 野菜類使用例
500~1,000倍、50~100ml/株
定植時~定植後、株元灌注



植物が生き活きと踊り出す! 海藻サンバ

より赤く!より甘く!より鮮やかに!

- ◆コリンによる光合成促進と発根促進
 - ◆海藻エキスによる発根促進
- 育苗期・生育期
1,000倍



防除チラシ掲載農薬は年間の通し回数をカウントしていません!
ご自身の散布履歴に合わせて薬剤を検討してください!



IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防 治療		希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数			
								ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	チリ
12	黒腐病・炭疽病 灰色かび病	セイビアーフロアブル20	○	—	1,000倍 (灰色かび病: 1,000~1,500倍)	前日	3回	0日			0日
28	コナジラミ類・オオカバコガ ハスモンヨトウ	兼商ヨーバルフロアブル	—	—	2,500~5,000倍 (コナジラミ類:2,500倍)	前日	2回	14日	14日 (如)		1日
7	うどんこ病・輪斑病 黒色根腐病 灰色かび病	アフエットフロアブル	○	△	2,000倍	前日	3回	0日	1日		0日
21A	ワタアブラムシ・コナジラミ類 ハダニ類・チャノコリガミ シクラメンホリガミ	サンマイトフロアブル	—	—	1,000~1,500倍	収穫開始 3日前	1回	4日	1~4 日		30日
10,1	炭疽病	ゲッター水和剤	○	○	1000倍	収穫開始 21日前	3回	0日	1日		14日
6	ハダニ類・オオカバコガ ヨトウムシ・ハスモンヨトウ	アフアーム乳剤	—	—	2,000倍	前日	2回	2日	2日		7日
11,7	うどんこ病・炭疽病 灰色かび病	シグナムWDG	○	○	2,000倍 (灰色かび病: 1,500~2,000倍)	前日	2回	0日	—	0日	—
23	アブラムシ類・コナジラミ類 アザミウマ類	モベントフロアブル	—	—	2,000倍	前日	3回	1日	30日		35日

作物によって対象病害虫や希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。