



イノチオ防除チラシ
2025年10月号

ハクサイ

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



この症状はどんな病気？～白斑病・べと病～

【白斑病(*Pseudocercospora capsellae*)】



老葉に**灰褐色、周縁水浸状の小斑点**が発生。数mm～2cm程度の円形～不整多角形に拡大し、**中央が灰白色又は黄褐色になり破れる**。新葉に広がり、結球葉にも発生。被害が激しい場合は、**火で炙ったように萎れ、枯れる**。べと病と併発すること多い。

【べと病(*Peronospora parasitica*)】



子葉や下葉に**淡黄色で不整形の病斑**が現れ、上位葉へ蔓延。**葉裏には汚白色のカビ**が生える。葉柄部では、黒点が線状に連なり、**墨が入ったような症状**となる。結球内部でも発生が見られ、葉柄部は「茎べと」、中肋部は「肋べと」と呼ばれる。

FRAC	対象病害	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期	回数
11,7	菌核病・黒斑病・白さび病 炭疽病・白斑病・べと病・尻腐病	シグナムWDG	○	○	1,500～2,000倍 (菌核病・炭疽病・尻腐病: 1,500倍)	7日前	3回
21,49	べと病	ゾーベックエンテクタSE	○	○	3,000倍	7日前	2回
4,M05	白さび病・べと病・ピシウム腐敗病	フォリオゴールド	○	○	1,000倍 (べと病:800～1,000倍)	7日前	2回
7	菌核病・黒斑病・白斑病・尻腐病	アフエットフロアブル	○	△	2,000倍	前日	3回
21	白さび病・べと病	ライメイフロアブル	○	—	2,000～4,000倍 (べと病:2,000～3,000倍)	7日前	4回

害虫の発生も多くなる季節です!予防的な散布を心掛け、発生前からの防除がおすすめです!

IRAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
4A	アブラムシ類・コカ・カブラハバチ・アオムシ	モスピラン顆粒水溶剤	1,000～2,000倍 (アブラムシ類:2,000～4,000倍 カブラハバチ:4,000倍)	14日前	3回
30	ウリバ類・コカ・ハモンヨトウ・ハマダラメカイ オオタバコガ・シロイモジヨトウ・アオムシ 等	グレーシア乳剤	2,000～3,000倍	7日前	2回
9D	アブラムシ類	セフィーナDC	2,000～4,000倍	前日	2回
6	コカ・オオタバコガ・ヨウムシ・アオムシ	アフーム乳剤	1,000～2,000倍	7日前	3回
22A	ウリバ類・コカ・カブラハバチ類・ヨウムシ ハマダラメカイ・アオムシ・シロイモジヨトウ	トルネードエースDF	2,000倍 (コカ・アオムシ:1,000～2,000倍)	7日前	2回
4C	アブラムシ類	トランスフォームフロアブル	2,000倍	3日前	3回
9B	アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍	3日前	3回

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

カルシウム欠乏(芯腐れ症)

生育旺盛な時期(3～4月)に**土壌中の窒素が多い場合や、土壌が乾燥している場合**に多発。窒素量や乾燥により、カルシウムの吸収が阻害されたり、植物体内での移行がしにくくなるのが原因で発生。
結球内部がとろけるように枯れるので「**芯腐れ症**」と呼ばれ、あんこ症と呼ばれることもある。




葉先枯れ予防に!!

ファイトカル

1,000倍 10～14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先までカルシウムを!!
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤、液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号