



イノチオ防除チラシ
2025年10月号

レタス

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目・アブラムシ類対策

アブラムシ類



ハスモンヨトウ



オオタバコガ



葉裏に1～2mmの虫が群がって吸汁し、葉が黄化して枯れることもある。
レタスの場合、**モザイク病を媒介する**。
卵ではなく直接幼虫を産むため、**短期間に増殖**する。9～11月は、モモアカアブラムシとニセダイコンアブラムシの発生が増加する。

頭部のやや後方に**1対の黒斑**がある。卵は50～200個程の卵塊で、**黄土色の鱗毛**に覆われている。集団で食害し、葉の表皮を残して白色のカスリ状に食害する。老齢幼虫では葉脈を残して暴食し、被害が大きい。

新葉を食害するため、展開してくる葉が穴だらけになる。**芯に潜り込んでしまうと防除が難しくなる**。
卵は1つずつ産卵するので集団での加害は少ないが、1頭の幼虫が渡り歩いて食害するため、寄生数が少なくても被害は拡大する。

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期		回数	
						レタス	非結球	レタス	非結球
4,M05	べと病	フォリオゴールド	○	○	800倍	14日前	リーフレタス 21日前	3回	リーフレタス 2回
9B	アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	—	—	3,000～4,000倍	前日	7日前	3回	
7	菌核病・白絹病 すそ枯病・灰色かび病	アフエットフロアブル	○	△	2,000倍	前日		3回	
5	オオタバコガ・ヨトウムシ	スピノエース顆粒水和剤	—	—	2,500～5,000倍 (ヨトウムシ:5,000倍)	3日前	7日前	3回	2回
49,40	べと病	オロンディスウルトラSC	○	○	2,000倍	7日前		2回	
30	アザミウマ類・ナメコリハエ・オオタバコガ ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・シロイモシヨトウ	グレース乳剤	—	—	2,000～3,000倍	3日前		2回	
U18	すそ枯病・軟腐病・腐敗病	バリダシン液剤5	○	—	800倍	前日	3日前	3回	
28	アブラムシ類・ウバキ類・ナメコリハエ類 オオタバコガ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ	兼商ヨーバルフロアブル	—	—	2,500～5,000倍	前日		3回	

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。



N-Catch
エヌキャッチ

野菜類使用例 50aあたり6.25g(1袋)
葉面散布/1～2回/生育初期

窒素固定細菌Gd(グルコンアセトバクター・ジアゾトロフィカス)

葉から植物体内に入り、空中の窒素を供給!

窒素不足時に効果を発揮するため、窒素過多の心配もなし!

酷暑対策に

収穫物の
品質向上に

作物の
生産性向上に



チップバーン予防に!!

ファイトカル

1,000倍 10～14日おきに葉面散布

▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先までカルシウムを!!

▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤、液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号