




イノチオ防除チラシ
2025年10月号

ミニトマト

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

クロマルハナバチってどんなハチ?



女王バチ

働きバチ

雄バチ

(アリスタライフサイエンスHPより引用)

【クロマルハナバチの特徴】

- ▶ 働きバチの数：約150~400匹
- ▶ セイヨウ種に比べて**高温時にも活性が高い!**
- ▶ おとなしい性格で攻撃性が低い
- ▶ メス(働きバチ, 女王バチ)とオスの区別が容易
- ▶ 在来種のため外来生物法に係る飼養許可が不要

ナチュポール・ブラック

※北海道では使用不可



◎ 白花や長花柱花には訪花しないので注意!

(アリスタライフサイエンスHPより引用)

◎ 活動の有無はバイトマークを確認!
過剰訪花の場合は次の対策をしましょう

- ・ 巣門を回収用にして、出巢制限をする
- ・ 乾燥花粉を給餌
- ・ 2~3日開放、2~3日閉じ込めの訪花制限

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数	
								ミツバチ	マルハナ
5	アザミウマ類・ハメグリバエ類 オオマルハナバチ	スピノエース顆粒水和剤	-	-	5,000倍	前日	2回	3日	3~7日
M07	うどんこ病・すすかび病 灰色かび病・葉かび病・斑点病	ベルコートフロアブル	○	-	4,000倍	前日	2回	0日	
34	マルハナバチ類 (シルバーリーフマルハナバチを含む) トマトヒゲナシ・アザミウマ類	ファインセーブフロアブル	-	-	1,000~2,000倍 (トマトヒゲナシ: 1,000~4,000倍)	前日	3回	1日	
4A	アブラムシ類・コナジラミ類 アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	-	-	2,000倍	前日	3回	1日	
28	ハメグリバエ類・オオマルハナバチ マルハナバチ	プレバゾンフロアブル5	-	-	2,000倍	前日	3回	1日	
7	うどんこ病・菌核病・すすかび病 灰色かび病・葉かび病・輪紋病	ネクスターフロアブル	○	-	1,000倍	前日	3回	1日	
6	コナジラミ類・トマトヒゲナシ ハメグリバエ類	コロマイト乳剤	-	-	1,500倍	前日	2回	1日	

作物によって対象病害虫や希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

フセキワイド フロアブル

うどんこ病に優れた予防効果!
新規作用機作のピリダクロメチル含有

1,000倍 / 収穫前日 / 2回
うどんこ病・すすかび病・葉かび病

※ベルコート水和剤・フロアブルとの使用回数注意



カテキンパワーUP

「カテキンパワー」がリニューアル!!

成分などの見直しで、
使いやすさがUP!!

水に溶けやすくなり、
散布しやすい!

成分：カテキン類 内容量：1リットル
野菜類使用例 500倍 葉面散布 樹勢回復

