



イノチオ防除チラシ
2025年10月号

イチゴ

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



クロマルハナバチってどんなハチ？



女王バチ

働きバチ

雄バチ

(アリスタライフサイエンスHPより引用)

ナチュベリー®

イチゴ専用の
新製品です！



【ミツバチと比較すると…】

- ▶ 低温の厳寒期や曇天、雨天時でも活動
→ミツバチの活性が低下する時期や
導入初期のサポートとして併用可！
- ▶ 働きバチ数は少ないが、1匹の訪花数は多い
→1巣箱で1日約30,000花を受粉可能
(使用面積の目安：10～20a/1巣箱)

※北海道では使用不可

【クロマルハナバチの特徴】

- ▶ 働きバチの数：約150～400匹
- ▶ セイヨウ種に比べて高温時にも活性が高い！
- ▶ おとなしい性格で攻撃性が低い
- ▶ メス(働きバチ、女王バチ)とオスの区別が容易
- ▶ 在来種のため外来生物法に係る飼養許可が不要



**防除チラシ掲載農薬は年間の通し回数をカウントしていません！
ご自身の散布履歴に合わせて薬剤を検討してください！**



天敵導入前防除～ハダニ対策～

☆11月中旬までには天敵を導入し、導入後1～2週間は、薬剤散布や葉かきは控えましょう！

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数			
								ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	チリ
12	黒腐病・炭疽病 灰色かび病	セイビアーフロアブル20	○	—	1,000倍 (灰色かび病: 1,000～1,500倍)	前日	3回	0日		0日	
—	アブラムシ類・ナジミ類 ハダニ類・うどんこ病	フーモン※	—	—	1,000倍	前日	—	0日		1日	
11	炭疽病・灰色かび病	ファンタジスタ顆粒水和剤	○	○	2,000～3,000倍 (炭疽病:2,000倍)	前日	3回	0日		0日	
25B	ハダニ類	ダニコングフロアブル	—	—	3,000倍	前日	1回	1日		0日	
M07	うどんこ病・黒斑病 炭疽病・灰色かび病	ベルコートフロアブル	○	—	2,000倍 (うどんこ病: 2,000～4,000倍)	前日 (生育期)	5回	0日		0日	
—	アブラムシ類・ナジミ類 ハダニ類・うどんこ病	フーモン※	—	—	1,000倍	前日	—	0日		1日	
3	うどんこ病・炭疽病	サンリット水和剤	○	○	2,000～4,000倍 (炭疽病:2,000倍)	前日	3回	1日	—	0日	—
33	ハダニ類	ダニオーテフロアブル	—	—	2,000倍	前日	2回	0日		0日	

※野菜類登録

ミツバチくん応援資材

カモンビービー

こんな時におすすめ！

- 低温や高温でハチが箱から出てこない
- 花が少なくハチが寄り付かない
- ハチが思う様に飛ばない
- 毎年着果不良や奇形果が多い

10パック入り(10a標準使用量：6パック)



※使用方法など詳細は
お問い合わせください!!

トリオバイタル

餌入り製剤2種の
同時訪飼で
ハダニをきっちり防除！

スパイデックスバイタル:
餌入り製剤でより安定し
た防除効果を発揮

