



イノチオ防除チラシ
2025年12月号

レタス

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

低温期に注意が必要な病気




この症状はどんな病気？ ～べと病・菌核病～

【べと病(*Bremia lactucae*)】



地際の外葉の表面に、輪郭不明瞭な淡黄色の病斑を生じ、**葉脈に囲まれた黄色の多角形の病斑**となる。**葉裏には汚白色で粉状のカビ**を生じ、後に灰褐色に変わる。発生の激しい時は葉全体が枯れる。
苗床で発生すると被害が大きくなる。生育期全般にわたって発生するが、**結球期以降に多い**。

【菌核病(*Sclerotinia sclerotiorum*)】



外葉の基部から発病することが多い。褐色水浸状の病斑を形成し、後に株元から腐敗、やがて株全体が軟腐する(軟腐病のような**悪臭はない**)。腐敗した株の基部などに、白色綿毛状の菌糸が密生し、やがて**黒色・ネズミの糞状の菌核**を形成する。菌核は被害残渣とともに土壌に残り、**数年生存する**場合もある。

FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用時期		回数	
						レタス	非結球	レタス	非結球
1	菌核病・灰色かび病 すそ枯病※	トップジンM水和剤	○	○	1,500～2,000倍 (すそ枯病※：1,500倍)	7日	21日	2回	
7	菌核病・白絹病 すそ枯病・灰色かび病	アフェットフロアブル	○	△	2,000倍	前日		3回	
11,7	菌核病・すそ枯病 灰色かび病・べと病	シグナムWDG	○	○	1,500倍 (べと病：1,500～2,000倍)	7日	14日	2回	
11	菌核病・灰色かび病 べと病・すそ枯病※	アミスター-20フロアブル	○	○	2,000倍	7日		4回	
11	菌核病・すそ枯病・灰色かび病	ファンタジスタ顆粒水和剤	○	○	2,000～3,000倍 (すそ枯病：2,000倍)	3日	14日	3回	
U17	べと病	ピシロックフロアブル	○	○	1,000倍	前日		3回	

※非結球レタス登録なし

+ 害虫対策におすすめはこちら！

IRAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期		回数	
				レタス	非結球	レタス	非結球
4C	アブラムシ類	トランスフォームフロアブル	2,000倍	前日		3回	
5	アザミウマ類・ハダカバエ類 オオタバコガ・ハスモンヨトウ	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日		2回	
28	アブラムシ類・ウバエ類・ハダカバエ類 オオタバコガ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ	兼商ヨーバルフロアブル	2,500～5,000倍	前日		3回	

対象病害虫や作物によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

速効的によく効く！

マイキラーL

水で希釈する液剤タイプなので、
広い面積や立体的な面にも効果的！

カタツムリ類・ナメクジ類
400倍 散布 収穫14日前まで / 3回



乾燥する季節にプラス1

ファイトカル

- ▶展着剤代わりに！ **1,000倍 葉面散布**
→優れた展着性と浸透性
- ▶チップバーンの予防として！
→素早くカルシウムを補給
- ▶凍寒害から植物を守る！
→トレハロース配合

アミスター、無機銅、
ホルモン剤、液肥類などの
混用は出来ません



肥料登録
生第83188号