



イノチオ防除チラシ
2025年12月号

イチゴ

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



気門封鎖剤特集



薬剤	サフオイル乳剤※	フーモン	粘着くん液剤
			
RACコード	NC	—	—
有効成分	調合油	ポリグリセリン脂肪酸エステル	ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
適用 病害虫	うどんこ病・アブラムシ類・コナジラミ類 ハダニ類・チャノホリダニ	うどんこ病・アブラムシ類 コナジラミ類・ハダニ類	うどんこ病・アブラムシ類 コナジラミ類・ハダニ類
希釈倍率	300倍 (アブラムシ類・ハダニ類：300～500倍)	1,000倍	100倍
使用時期	前日	前日	前日
使用回数	—	—	—
特長	☆殺卵活性あり、全ステージ有効 ☆有機JAS使用可能	☆展着剤としても使用可能 ☆1,000倍希釈でも高い効果	☆優れた速効性(散布後10～20分) ☆低い環境負荷

※イチゴではオーソサイド水和剤80及びデランフロアブルとの混用不可。
近接散布は28日以上あける。28日以上あけても下葉に薬害の恐れあり



防除チラシ掲載農薬は年間の通し回数をカウントしていません！
ご自身の散布履歴に合わせて薬剤を検討してください！



IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数			
								ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	チリ
11,7	うどんこ病・炭疽病 灰色かび病	シグナムWDG※	○	○	2,000倍 (灰色かび病： 1,500～2,000倍)	前日	2回	0日	—	0日	—
—	うどんこ病・アブラムシ類 コナジラミ類・ハダニ類	フーモン	—	—	1,000倍	前日	—	0日	0日	—	1日
U13,9	うどんこ病・灰色かび病	ショウチノスケフロアブル	○	○	2,000倍	前日	2回	0日	—	—	0日
34	アザミヤカ類	ファインセーブフロアブル	—	—	1,000～2,000倍	前日	3回	1日	—	—	0日
7	うどんこ病・灰色かび病	ケンジャフロアブル	○	—	1,500倍	前日	3回	1日	—	—	0日
25A	ハダニ類・シクリメホリダニ	スターマイトフロアブル	—	—	2,000倍	前日	2回	1日	—	—	0日
3	うどんこ病・じゃのめ病 輪斑病	トリフミン水和剤	○	○	3,000倍 (うどんこ病： 3,000～5,000倍)	前日	5回	0日	1日	—	0日
28	アブラムシ類・コナジラミ類 アザミヤカ類・ハダニ類 ハスモンヨトウ・チャノホリダニ	ベネビアOD	—	—	2,000倍 (ハスモンヨトウ： 2,000～4,000倍)	前日	3回	1日	—	—	0日

※カンタスドライフロアブルとの使用回数注意