



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チャノホコリダニの被害に注意！

チャノホコリダニ



成虫の体長は0.2mmで非常に小さく、**肉眼では見えない**ため、病害や生理障害と間違いやすい。**葉の縁が内側に曲がる・新芽の萎縮・果実のガクと周辺に傷が付き褐色になる**という3点で判断できる。古葉には見られない。果実の被害はミナミキイロアザミウマの被害に似るが、**ガク全体に傷がつく**ことで区別できる。

新芽を開いて注意深くルーペで見ると、白色半透明・楕円形の成虫が見える。卵は楕円形で、**表面は白色の気泡状の点刻**で覆われている。

目には見えないから病気なのか虫なのか原因が分からない…



イノチオHDでは病害虫診断を行っています！

顕微鏡や検査キットを用いて、原因となる病原菌や害虫、ウイルスを検査します。**迅速・的確な診断**で、適した農薬や対策をご提案いたします。見分けが難しいものや、早急な対応が必要な病害虫も多く存在します。誤った防除を行い、被害をが広がる前に、一度診断を受けてみてはいかがでしょうか？

詳細は各担当営業までお問い合わせください！

⚠ 防除チラシ掲載農薬は年間の通し回数をカウントしていません！ご自身の散布履歴に合わせて薬剤を検討してください！ ⚠

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用 時期	回数
M07, 53	うどんこ病・すすかび病	フセキワイドフロアブル	○	○	1000倍	前日	3回
23	うどんこ病・アブラムシ類・コナジラミ類・アザミウマ類・ハダニ類・チャノホコリダニ・コナカイガラムシ類	モベントフロアブル	—	—	2000倍	前日	3回
7	うどんこ病・褐色斑点病・菌核病・黒枯病・すすかび病・灰色かび病	ネクスターフロアブル	○	—	1000倍	前日	3回
30	コナジラミ類・アザミウマ類・ハダニ類・ハモグリバエ類・オオタバコガ・ハモシトウ・チャノホコリダニ	グレーシア乳剤	—	—	2000倍	前日	2回
3	うどんこ病・黒枯病・すすかび病	スコア顆粒水和剤	○	○	2000倍	前日	3回
6	コナジラミ類・アザミウマ類・ハダニ類・ハモグリバエ類・オオタバコガ・ハモシトウ・チャノホコリダニ	アフーム乳剤	—	—	2000倍	前日	2回
9	うどんこ病・黒枯病・灰色かび病	フルピカフロアブル	○	—	2000～3000倍	前日	4回
20B	ハダニ類・チャノホコリダニ	カネマイトフロアブル	—	—	1000～1500倍 (チャノホコリダニ:1000倍)	前日	1回

新規殺虫剤 落ちる害虫、活きる益虫

エフィコン[®]SL

IRAC : 36

- ◆ 有効成分アクサリオンが害虫の行動を阻害
- ◆ 抵抗性害虫への優れた効果
- ◆ 有益昆虫に影響が少ない

なす登録内容

コナジラミ類 1000倍 収穫前日まで 2回以内
アブラムシ類は 1000～2000倍



● 高温対策専用バイオスティミュラント

炎天マスター



高温ストレスに遭遇する前に処理すると…
→ **高温耐性のスイッチON!**

- ◎ HSF遺伝子の発現量増加
(高温に備える指令を伝える遺伝子)
- ◎ 活性酸素種(ROS)の除去
(ストレスを感じると増加し植物を傷つける物質)

500～1000倍 7～14日間隔 葉面散布

