



イノチオ防除チラシ
2026年4月号

スイートコーン

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



この症状はどんな病気？～すす紋病・褐色腐敗病～

【すす紋病 (Exserohilum turcicum) 糸状菌】



葉に紡錘形で、初めは暗緑色水浸状、後に灰白色の**大型病斑を形成する**。病斑は、小さくても5cm程度で、10cm以上となることが多く、収穫前には**全葉が枯死することもある**。古い病斑の表面には、**すす状のカビ**を生じる。

【褐色腐敗病 (Burkholderia gladioli) 細菌】



雌穂の**包皮(皮の部分)基部に褐色の水浸状病斑**が発生。褐色の病斑は次第に広がり、包皮基部全体が褐変することがあります。特に**高温多湿**の条件下で発生しやすいです。



**防除チラシ掲載農薬は年間の通し回数をカウントしていません！
ご自身の散布履歴に合わせて薬剤を検討してください！**



殺菌剤のおすすめはこちら！

IRAC	登録	対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
11, 7	未成熟とうもろこし	すす紋病	シグナムWDG	2000倍	7日前	2回
7	未成熟とうもろこし	紋枯病	アフエットフロアブル	2000倍	7日前	2回
31	未成熟とうもろこし	褐色腐敗病	スターナ水和剤	1000倍	前日	3回

殺虫剤のおすすめはこちら！

IRAC	登録	対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
6	ヤングコーン	オタバコガ・ヨウムシ・ハダニ類	アフーム乳剤	1000～2000倍	前日	2回
	未成熟とうもろこし	オタバコガ・ヨウムシ・ツマジロガヨウハダニ類		1000～2000倍	3日前	2回
4 A	ヤングコーン	アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	前日	2回
	未成熟とうもろこし	アブラムシ類		2000～4000倍	前日	3回
29	ヤングコーン	アブラムシ類	ウララDF	2000～4000倍	前日	2回
	未成熟とうもろこし	アブラムシ類		2000～4000倍	3日前	2回
30	ヤングコーン	ハダニ類	グレーシア乳剤	2000～3000倍	前日	1回
	未成熟とうもろこし	ハダニ類		2000～3000倍	前日	2回

作物によって対象病害虫や希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

※野菜類登録

とうもろこしは種類によって農薬使用基準が異なります！

スイートコーンの収穫前にヤングコーンを収穫する場合は、必ずどちらにも登録されている薬剤を使用して下さい。
※スイートコーンの農薬使用回数には、ヤングコーンで使用した回数を含めて下さい。

スイートコーン

とうもろこし登録もしくは
未成熟とうもろこし登録

ヤングコーン・ベビーコーン

ヤングコーン登録もしくは
野菜類登録

光合成能力UP！

ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP！

★苦土欠乏による

葉色低下対策に！



肥料登録
生第87201号