



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 育苗期～定植時おすすめ防除

				
薬剤名	ミネクトデュオ粒剤	ベリマークSC	兼商ヨーバルフロアブル	フィールドマストフロアブル
IRAC	28,4A	28	28	4E
適用害虫	アブラムシ類・コナガ アザミウマ類・アオムシ ハマダラメカイ	アブラムシ類・ウバ類 シロイモジヨトウ・アオムシ コナガ・キスジノミハムシ アザミウマ類・ハスモンヨトウ ネリムシ類・ヨトウムシ ハマダラメカイ	アブラムシ類・アザミウマ類 コナガ・アオムシ・ハスモンヨトウ ネリムシ類・ハマダラメカイ	ウバ類・コナガ・アオムシ カブラハバチ類・ナメグリハバチ ハマダラメカイ・ヨトウムシ ハスモンヨトウ・シロイモジヨトウ
使用量 希釈倍率	セルトレイ1箱、ペーパー ポット1冊あたり40g	400倍	200倍	4000倍
使用方法	散布	灌注	灌注	散布
使用時期	は種覆土後～ 育苗期後半	育苗期後半～定植当日	育苗期後半～定植当日	収穫前日
使用回数	1回	1回	1回	2回

**⚠️ ミネクトデュオ粒剤を使用した場合、下記の薬剤は苗場での使用ができません!! ⚠️**  
ベリマークSC・ベネビアOD・アクタラ粒剤5・ジュリボフロアブル・プリロッソ粒剤オメガ・アベイル粒剤・アクタラ顆粒水溶剤



育苗期にも病害の発生が見られます! 予防的防除を心掛けましょう!



IRAC	対象病害	薬剤名	予防	治療	希釈倍数	使用方法	使用時期	回数
11	黒斑病 根朽病 株腐病	ファンタジスタ顆粒水和剤	○	○	2000倍	散布	収穫3日前	3回
P02	黒腐病	オリゼメート粒剤	○	-	6~9kg/10a	全面土壌混和又は 作条土壌混和	定植時	1回

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

初期雑草防除の決定版!

## ラッソー® 乳剤

雑草発生前の土壌処理により、一年生雑草に高い防除効果を示します!!

適用時期 定植8日後まで  
使用回数 1回  
希釈水量 100ℓ/10a  
全面土壌散布 150~200ml/10a



育むのは、作物と笑顔。  
畑の頼れるパートナー。

※砂土では使用  
しないでください

## フィールドスター®P乳剤

40日以上長期持続効果!!  
一年生イネ科雑草、スベリヒユなどに!

適用時期 定植10日後まで  
使用回数 1回  
希釈水量 100ℓ/10a  
全面土壌散布 50~75ml/10a

