



イノチオ防除チラシ
2026年8月号

キャベツ

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ナメクジ対策 おすすめ薬剤



ナメクジ

新芽や若葉など柔らかい葉を舐めるように食害する。食害痕は果実や葉に穴が開き、ヨトウムシと似ているが、ナメクジの場合、糞や筋状の粘液が付着している。傷口から病害感染を助長する。

発生時期	春・秋(年間1~2世代) 4~6月に産卵、40日ほどで孵化し、秋までに成体になる ※種類によって異なる
生育適温	15~30℃ それ以上の高温は徐々に死亡する 低温には強く、0~10℃以下でもすぐに死亡しない
被害作物	キャベツ・ハクサイ・ブロッコリー・トマト・ピーマン・ナス・セルリーなど カンキツの果実の傷は大きくなると目立つ




ナメクリーン3

ナメクジ類・カタツムリ類を誘引し、摂食させて効果を発揮させるベイト剤

カタツムリ類・ナメクジ類

1~3kg/10a 株元散布 収穫14日前まで / 2回



スラゴ

幅広い農作物や有機農産物栽培でも使用可!

カタツムリ類・ナメクジ類: 1~5g/m²

アフリカマイマイ: 3~5g/m² ヒメリンゴマイマイ: 5g/m²

発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置

発生時 / 一回

チョウ目害虫に注意!

気温が上昇するとチョウ目害虫の発生が増加します。

大量発生し、被害が拡大する前に定期的な防除を心掛けましょう!

シロイチモジヨトウ



ハスモンヨトウ



オオタバコガ



IRAC	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
4E	コナガ・カブラハバチ類・アオシ・ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ・シロイチモジヨトウ 等	フィールドマストフロアブル	4000倍	前日	2回
13	コナガ・オオタバコガ・ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ・アオシ 等	コテツフロアブル	2000倍	前日	2回
28	アブラムシ類・アザミウマ類・オオタバコガ ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ・ハイマダラノメイガ 等	兼商ヨーバルフロアブル	2500~5000倍	前日	3回
30	コナガ・アザミウマ類・オオタバコガ ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ・ハイマダラノメイガ 等	グレースシア乳剤	2000~3000倍	7日前	2回

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

徒長対策におすすめ!



このような症状には注意!

- ・植物の元気がない
- ・葉色が薄い
- ・葉と葉の間隔が長い
- ・自力で立てない



エレマックス赤 0-28-26

肥料登録:
輸第9423号

亜リン酸配合! 軟弱徒長株を強く!

- ▶ 樹を締めて徒長防止! 1000倍 葉面散布
- ▶ 抵抗力の向上に!

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避ける。
※カテキンパワーとの混用は可能です



マグマSi

吸収性の高い水溶性ケイ酸資材

- ▶ 細胞壁の強化
- ▶ 高温・低温への抵抗性
- ▶ 耐病性の向上
- ▶ 成長促進・抑制のコントロール

〈葉面散布〉
育苗期2,000 (春夏)
成長期5,000~10,000倍
〈灌水〉
原液100~200ml/10a
倍率コントロール
20,000~50,000倍



ファイトO2

肥料登録:
生第83241号

安心・安全の「天然成分」で、抵抗力を引き出す

- ▶ 葉が立つ、葉がしまる
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 葉の未消化窒素の分解を助ける

1000倍 葉面散布、定植時のどぶづけ