



イノチオ防除チラシ
2026年8月号

ハクサイ

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

育苗期～定植時おすすめ防除

			
薬剤名	ミネクトデュオ粒剤	ベリマークSC	オリゼメート粒剤
IRAC・FRAC	28,4A	28	P02
適用害虫	アブラムシ類・ヨカガ・カブラハバチ キジノミルシ・ハヤダラノメイガ・アオムシ	アブラムシ類・ヨカガ・カブラハバチ類・アオムシ キジノミルシ・ハヤダラノメイガ・アオムシ	軟腐病
希釈倍率 使用量	セルトレイ1箱あたり40g	400倍 (セルトレイ1箱あたり0.5L)	6～9kg/10a
使用方法	散布	灌注	全面土壌混和
使用時期	は種覆土後～育苗期後半	育苗期後半～定植当日	は種時又は定植時
使用回数	1回	1回	1回



ミネクトデュオ粒剤を使用した場合、下記の薬剤は苗場での使用ができません!!



ベリマークSC・ベネビアOD・アクタラ粒剤5・ジュリボフロアブル・プリロッソ粒剤オメガ・アベイル粒剤・アクタラ顆粒水溶剤

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

除草剤一覧

RAC	薬剤名	注意事項	希釈倍数	使用時期	回数
15	ラッソー乳剤	砂質土壌	150ml/10a	は種直後	1回
3	トレファノサイド乳剤	露地栽培(無マルチで使用) ※ツリガナ科、ガツリガナ科、オコギリ科、アブラナ科を除く	200～300ml/10a	直播: は種直後 移植: 定植前(植穴掘前) 移植畦間処理: 定植直後	1回
3	トレファノサイド粒剤2.5	露地栽培(無マルチで使用) ※ツリガナ科、ガツリガナ科、オコギリ科、アブラナ科を除く	3～5kg/10a 4～6kg/10a	直播: は種直後 移植: 定植前	1回
3	クレマート乳剤	定植後に激しい降雨	200ml/10a	定植前(雑草発生前)	1回
3	ゴーゴーサン乳剤	セル成型苗	200～300ml/10a	定植前(雑草発生前)	1回
3	ゴーゴーサン細粒剤	セル成型苗	4～6kg/10a	定植前(雑草発生前)	1回



除草剤を使用する場合は、薬害が発生する可能性があるのでラベルを確認してから使用してください。



前作に病気や雑草でお困りの方は土壌消毒が有効です！



効果を上げるポイント！

- ① 耕耘を丁寧に行う
→ 固まっている土の内部は消毒されません！
- ② 被覆を必ず行う
→ 被覆を行わないと薬剤が抜けやすくなり、
表層しか消毒できません！

バスアミド®

微粒剤

黄化病・根くびれ病・根こぶ病・尻腐病

ネコブセンチュウ・一年生雑草

20～30kg/10a は種又は定植21日前まで / 1回
所定量を均一に散布して土壌と混和する

