



イノチオ防除チラシ  
2026年8月号

# メロン

inochio  
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 栽培終了時の残渣処理特集

### コナジラミを減らすために

#### ①有効薬剤を散布し、栽培終了時に虫を死滅させましょう。

外に出た害虫は、露地で繁殖し、再び次作で飛来・侵入します！  
次作のための防除をしっかりと行いましょう！

#### 栽培終了時散布おすすめ薬剤

モメントフロアブル 2000倍 前日/3回

+ ベストガード水溶剤 1000～2000倍 7日前/3回

#### コナジラミ類の成長スピード

| 気温   | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 卵～成虫 | 88日 | 36日 | 23日 | 21日 |



温度上昇に伴って一世代のサイクルが速くなります！  
大量発生を防ぐためにも栽培終了後、速やかな防除をおすすめします！

#### ②ハウスの場合は1～2週間締切、ハウス内の温度を出来るだけ上げて蒸し込みます。

※温度を上げ過ぎると塩ビ管の糊が溶けたり、資材や機器類に影響する恐れがありますので注意してください。

## コナジラミ類 農薬以外での防除のおすすめ

#### ①ホリバー

粘着板を活用し、  
成虫を捕獲することで、  
産卵数を抑えることが  
できます！

コナジラミ対策には  
黄色がおすすめです！



#### ②防虫ネット

ハウス開口部に防虫ネットを  
展張することで、ハウス外から  
の飛び込み抑制することがで  
きます！

コナジラミ類対策には  
**0.4mm目合い**のネットが  
おすすめです！

#### ③除草



雑草はコナジラミ類の**発生源**と  
なります。

露地栽培の方は圃場周辺の  
除草を心掛け、ハウス栽培の方  
も、外の雑草からの飛び込みの  
リスクを減らしましょう！

# キルバー®

土壌くん蒸剤

多くの病害 / センチュウ、ネダニ、アザミウマ類  
一年草雑草にも効果的！

- ・前作のコナジラミ類蔓延防止に！
- ・刺激臭が少なく、作業しやすい
- ・複数の処理方法から選択可能

前作の古株枯死

1回 / 原液として40～60L/10a



非選択性茎葉処理移行型

本剤使用回数：3回/樹木など

# 雑草退治 カレター®

除草剤



| 対象雑草  | 使用時期 | 10a当たり |            |
|-------|------|--------|------------|
|       |      | 薬量     | 希釈水量       |
| 一年生雑草 | 生育初期 | 500ml  | 通常散布100L   |
| 多年生雑草 |      | 1000ml | 少量散布 25L   |
| スギナ   | 生育盛期 | 2000ml | 少量散布25～50L |

※キク・花卉類登録ございません。圃場周りの除草作業にご利用ください。