

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



！ 防除チラシ掲載農薬は年間の通し回数をカウントしていません！ご自身の散布履歴に合わせて薬剤を検討してください！

## 灌注剤を上手に使って作物を病害虫から守りましょう！

| おすすめ<br>薬剤 | ピシロックフロアブル | ランマンフロアブル            | モベントフロアブル                                                | ベリマークSC                                           |
|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|            |            |                      |                                                          |                                                   |
| RACコード     | U17        | 21                   | 23                                                       | 28                                                |
| 適用病害       | 疫病         | 疫病                   | うどんこ病<br>アブラムシ類・コナジラミ類<br>アザミウマ類・チャノコリガミ<br>ハダニ類・カバネノバノミ | アブラムシ類・コナジラミ類<br>アザミウマ類・ハスモンヨトウ<br>コナジラミ類・カバネノバノミ |
| 希釈倍率       | 500倍       | 500～1000倍            | 250倍<br>(うどんこ病：500倍)                                     | 1000倍                                             |
| 使用液量       | 50～100mL/株 | 100mL/株              | 25mL/株<br>(うどんこ病：50mL/株)                                 | 50mL/株<br>(アブラムシ類：25～50mL/株)                      |
| 使用時期       | 開花前まで      | 生育期<br>(但し、収穫30日前まで) | 育苗期後半～定植当日                                               | 育苗期後半～定植当日                                        |
| 使用回数       | 2回         | 2回以内                 | 1回                                                       | 1回                                                |

対象病害虫によって希釈倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

## 定植時～定植後 おすすめ防除

| IRAC<br>FRAC | 対象病害虫                                    | 薬剤名         | 予防 | 治療 | 希釈倍数                   | 使用時期         | 回数 | 影響日数     |      |     |     |
|--------------|------------------------------------------|-------------|----|----|------------------------|--------------|----|----------|------|-----|-----|
|              |                                          |             |    |    |                        |              |    | ミツバチ     | マルハナ | ミヤコ | チリ  |
| M04          | 灰色かび病<br>炭疽病・芽枯病                         | オーソサイド水和剤80 | ○  | —  | 800倍                   | 収穫開始<br>14日前 | 5回 | 1日       | 0日   | 0日  |     |
| 9B           | アブラムシ類・コナジラミ類                            | コルト顆粒水和剤    | —  | —  | 3000～4000倍             | 前日           | 3回 | 放飼<br>不可 | 7日   | —   |     |
| 40           | 疫病                                       | レーバスフロアブル   | ○  | —  | 2000倍                  | 前日           | 2回 | 1日       | 1日   | —   | 0日  |
| 13           | ミカンキロアザミウマ・ハダニ類<br>ハスモンヨトウ<br>シクラメンホコリガミ | コテツフロアブル    | —  | —  | 2000倍                  | 前日           | 2回 | 10日      | 9日   | 14日 | 14日 |
| 3            | うどんこ病・炭疽病※                               | サンリット水和剤    | ○  | ○  | 2000～4000倍<br>(※2000倍) | 前日           | 3回 | 1日       | —    | 0日  | —   |
| 6            | ハダニ類・オオハナカガ<br>ハスモンヨトウ・ヨトウムシ             | アフーム乳剤      | —  | —  | 2000倍                  | 前日           | 2回 | 2日       |      | 7日  |     |

### デラン®フロアブル

殺菌剤

幅広い抗菌活性！  
優れた保護効果、耐雨性！  
耐性菌対策にも有効！

適用病害：炭疽病 希釈：1000倍  
使用量：100～300ℓ/10a 育苗期2回



### ユニフォーム®

粒剤

高品質な収穫をサポート！  
収穫品質の維持に貢献！  
粒剤で散布がしやすい！

適用病害：疫病  
使用量：10kg/10a 定植時 1回

疫病対策に！

