



イノチオ防除チラシ
2026年8月号

トマト

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナジラミ類対策 ～定植時～

！ 防除チラシ掲載農薬は年間の通し回数をカウントしていません！
！ ご自身の散布履歴に合わせて薬剤を検討してください！



タバココナジラミ

大きさは約0.8mm。最適温度は25～30℃。
排泄物が付着した葉や果実に**すす病が発生**
すると商品価値が下がってしまう。
黄化葉巻病などのウイルス病を媒介する。



すす病被害



オンシツコナジラミ

大きさは約1.2mm。最適温度は20～28℃。
寄生する植物が多いため、多作物や雑草からの
飛来によって多発する。

冬			春			夏			秋		
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

冬			春			夏			秋		
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

IRAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
23	コナジラミ類・アブラムシ類 トマトヒゲダニ・アザミウマ類	モベントフロアブル	2000倍	前日	3回	30日
4A	コナジラミ類・アブラムシ類 アザミウマ類・クハバネノコバエ類	ベストガード水溶剤	1000～ 2000倍	前日	3回	10日
9B	コナジラミ類・アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4000倍	前日	3回	7日
6	コナジラミ類・トマトヒゲダニ アザミウマ類・トマトヒゲノコバエ・トマトヒゲガ	アグリメック	500～ 1000倍	前日	3回	7日



この症状はどんな病気？ ～斑点細菌病・茎えそ細菌病～

【斑点細菌病(Xanthomonas)】

葉に暗褐色、水浸状で**周りが淡黄色の小斑点**を生じる。のちに円形または不整形になり、ややへこみ、褐色や黒色になる。
茎では、暗緑色水浸状の小斑点を生じ、やや隆起して黄白色のかさぶた状になる。



【茎えそ細菌病(Pseudomonas)】

葉柄基部を中心とした茎と葉柄に発生。
維管束に沿って壊死するとともに、茎の表面に黒褐色のしみ状病斑を生じる。
芽かきなどの傷口から病原菌が侵入する。



【細菌病の主な対策】

- ▶ 葉が濡れている時の葉かきなどの作業は、感染を拡げるので避ける。
- ▶ 湿度を下げる。

IRAC:30

新発売

サイモディス® DC
PLINAZOLIN® technology

- ◆ コナジラミ類などに対して効果あり
- ◆ 食毒・接触毒、浸透性あり
- ◆ DC製剤の優れた付着性
- ◆ ミツバチ、マルハナバチは翌日から導入可

トマト 登録内容

コナジラミ類、トマトヒゲダニ、トマトヒゲノコバエ など
2500倍 収穫前日まで 2回以内



細菌病対策におすすめ剤はこちら！



兼商クプロシールド

- ・使用回数のカウントなし
- ・溶けやすく、汚れが少ない！
- ・有効成分：塩基硫酸銅(FRAC:M01)

発病前～発病初期

1000倍：かいよう病・すすかび病・葉かび病

1000～2000倍：疫病

