イノチオ防除チラシ
2026年9月号

ミニトマト

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ウイルス病に注意！

どちらの対策も
コナジラミ類防除が基本です!

タバココナジラミ

オンシツコナジラミ

この症状はどんな病気？～黄化葉巻病・黄化病～

【黄化葉巻病(*Tomato yellow leaf curl virus(TYLCV)*)**】**

上位葉の葉縁や葉脈間の黄化と葉巻、萎縮、小葉化などが見られる。症状の発生した部位から上の茎葉は黄化し、生育が抑制される。発病株では、早期に落花する。
タバココナジラミによって媒介される。
※近年、抵抗性品種では典型的な症状が見られないこともあるので注意！

【黄化病(*Tomato chlorosis virus (ToCV)*)**】**

下位葉～中位葉で葉脈間が退緑黄化する。葉脈に沿った部分を残して黄色、紫色に変色する。えそ斑となる場合もある。発病株は生育が抑制される。
マグネシウム欠乏症に似ているため、判別が難しい。タバココナジラミ及びオンシツコナジラミによって媒介される。

イノチオHDでは農作物の病害虫診断を行っております！

顕微鏡や検査キットを用いて、原因となる病原菌や虫、ウイルスを検査します。
速く・正確な診断で、適した農薬や対策をご提案いたします。
見分けが難しいものや、早急な対応が必要な病害虫も多く存在します。
間違った防除を行い、被害を広げてしまう前に、一度診断をしてみてはいかがでしょうか？

詳細は各担当営業に
お問い合わせください！

IRAC FRAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	マルハナバチ影響日数
4C	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ﾄﾏﾄｻﾋﾞﾀﾞﾆ	**トランスフォームフロアブル**	1000～2000倍 (ｱﾌﾞﾗﾑｼ類:2000倍)	前日	2回	2～5日
－	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ﾊﾀﾞﾆ類・ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・うどんこ病	**フーモン**	1000倍	前日	－	0日
6	ﾄﾏﾄｻﾋﾞﾀﾞﾆ・ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ・ﾄﾏﾄｷﾊﾞｶﾞ・ｺﾅｼﾞﾗﾐ類	**アファーム乳剤**	2000倍	前日	5回	2日
15	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ﾄﾏﾄｻﾋﾞﾀﾞﾆ・ｱｻﾞﾐｳﾏ類	**マッチ乳剤**	2000倍	前日	2回	0日
4A	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ｶﾒﾑｼ類	**アルバリン顆粒水溶剤**	2000～3000倍 (ｶﾒﾑｼ類:2000倍)	前日	2回	**14日 (ｸﾛ22日)**
UN M10	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ﾄﾏﾄｻﾋﾞﾀﾞﾆ・うどんこ病	**パルミノ**	2000倍	前日	5回	1日 (ｸﾛ)
9B	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	**コルト顆粒水和剤**	4000倍	前日	3回	7日
NC	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ﾊﾀﾞﾆ類・ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ★うどんこ病・★ﾄﾏﾄｻﾋﾞﾀﾞﾆ・★ﾁｬﾉﾎｺﾘﾀﾞﾆ	**サフオイル乳剤**	300～500倍 (★:300倍)	前日	－	0日

対象病害虫によって**希釈倍数**が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

高温対策専用バイオスティミュラント

炎天マスター

高温ストレスに遭遇する前に処理すると…
→**高温耐性のスイッチON!**

◎**HSF遺伝子の発現量増加**
(高温に備える指令を伝える遺伝子)

◎**活性酸素種(ROS)の除去**
(ストレスを感じると増加し植物を傷つける物質)

500~1000倍
7~14日間隔
葉面散布

クロスバリュー

2種類の微生物の力で

- **環境ストレスへの耐性強化**
- **収量や品質の安定化**

野菜類使用例
500～1000倍、50～100ml/株
定植時～定植後、株元灌注