

月	散布時期	対象病害虫	薬 剤 名	倍数 ^(100ℓ当り薬量)	安全使用日数と 本剤の使用回数	10a当り 散布量	防除の注意事項等																																				
3月	発 芽 前 (月 日)	カイガラムシ類	トモノールS	50倍(2 ℓ)	発 芽 前	300 ℓ	■黒斑病の病原細菌は2年生枝の病斑部や芽の付近に潜伏し越冬する。春にこれら付近に病斑を形成し降雨時に病原細菌が放出されて伝搬する。春期に黒斑病に感染している枝は健全芽を複数含めて剪除し処分する。																																				
		ふくろみ病	チオノックフロアブル	500倍(200mℓ)	収穫14日前までの3回以内																																						
		カイガラムシ類幼虫	アブロードフロアブル	1,000倍(100mℓ)	収穫14日前までの2回以内																																						
	休 眠 期 (黒斑病対策) (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	300 ℓ	■黒斑病の発生園地では散布する。																																				
		黒斑病・ふくろみ病	ムッシュボルドーDF	500倍(200 g)	葉芽発芽前まで																																						
4月	開 花 前 (中 旬) (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	300 ℓ	【黒斑病】① ■葉や新梢では5月中旬頃から、果実では6月上旬頃から発生し始める。5～6月に降雨が多いと発生しやすくなり、強風や大雨により急激に発生する場合がある。日本すももは一般に弱く、特に大石早生・秋姫・ビューティ・サンタローザは発病しやすい。																																				
		灰 星 病	スミレックス水和剤	1,000倍(100 g)	収穫14日前までの1回																																						
			海藻サンバ	2,000倍(50 g)	―――																																						
	下 旬 (月 日)	スモモヒメシンクイ	ナシヒメコン	100本/10a当り																																							
5月	落花直後 (上 旬) (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	300 ℓ	■果実よりヤニが発生しやすい園地では5/上～下に2回程度ソリボー1000倍を散布する。																																				
		灰 星 病	フルーツセイバー	1,500倍(66mℓ)	収穫24時間前までの3回以内																																						
		黒 斑 病	マイコシールド	2,000倍(50 g)	収穫21日前までの3回以内																																						
		ハマキムシ類 シンクイムシ類	サムコルフロアブル10	2,500倍(40mℓ)	収穫3日前までの3回以内																																						
	中 旬 (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	400 ℓ	すももの灰星病対策には  フルーツセイバー ® ◆ 優れた予防効果で灰星病を防除します。																																				
		炭 そ 病	チオノックフロアブル	500倍(200mℓ)	収穫14日前までの3回以内																																						
		黒 斑 病	マイコシールド	2,000倍(50 g)	収穫21日前までの3回以内																																						
		シンクイムシ類 アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍(50 g)	収穫24時間前までの3回以内																																						
	下 旬 (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	400 ℓ																																					
		炭 そ 病	チオノックフロアブル	500倍(200mℓ)	収穫14日前までの3回以内																																						
		シンクイムシ類 カメムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍(50 g)	収穫24時間前までの3回以内																																						
		カイガラムシ類幼虫	アブロードフロアブル	1,000倍(100mℓ)	収穫14日前までの2回以内																																						
	6月	上 旬 (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	400 ℓ	■ナリアWDGのなしへの注意点として、開花始めから落花20日頃までの散布は、葉に薬害を生じるおそれがあるので使用しない。また、ル・レクチエには果実に薬害が生じる恐れがあるので袋掛け後に使用するとあるので飛散には注意する。																																			
灰 星 病			ナリアWDG	2,000倍(50 g)	収穫24時間前までの2回以内																																						
シンクイムシ類 ケムシ類			エクシレルSE	2,500倍(40mℓ)	収穫24時間前までの3回以内																																						
中 旬 (月 日)		―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	400 ℓ	樹の生育 <table><tr><th colspan="3">山形県農業総合研究センター園芸農業研究所</th></tr><tr><th colspan="2">時 期</th><th>品 種</th></tr><tr><td rowspan="2">発 芽 期</td><td>平 年</td><td>3月31日</td></tr><tr><td>前 年</td><td>3月28日</td></tr><tr><td rowspan="2">展 葉 期</td><td>平 年</td><td>4月19日</td></tr><tr><td>前 年</td><td>4月14日</td></tr><tr><td rowspan="2">開 花 始</td><td>平 年</td><td>4月18日</td></tr><tr><td>前 年</td><td>4月 8日</td></tr><tr><td rowspan="2">満 開 期</td><td>平 年</td><td>4月23日</td></tr><tr><td>前 年</td><td>4月14日</td></tr><tr><td rowspan="2">落 花 期</td><td>平 年</td><td>5月 2日</td></tr><tr><td>前 年</td><td>4月30日</td></tr><tr><td rowspan="2">収 穫 盛 期</td><td>平 年</td><td>7月 7日</td></tr><tr><td>前 年</td><td>7月 5日</td></tr></table>	山形県農業総合研究センター園芸農業研究所			時 期		品 種	発 芽 期	平 年	3月31日	前 年	3月28日	展 葉 期	平 年	4月19日	前 年	4月14日	開 花 始	平 年	4月18日	前 年	4月 8日	満 開 期	平 年	4月23日	前 年	4月14日	落 花 期	平 年	5月 2日	前 年	4月30日	収 穫 盛 期	平 年	7月 7日	前 年	7月 5日
		山形県農業総合研究センター園芸農業研究所																																									
		時 期		品 種																																							
発 芽 期		平 年	3月31日																																								
		前 年	3月28日																																								
展 葉 期		平 年	4月19日																																								
		前 年	4月14日																																								
開 花 始	平 年	4月18日																																									
	前 年	4月 8日																																									
満 開 期	平 年	4月23日																																									
	前 年	4月14日																																									
落 花 期	平 年	5月 2日																																									
	前 年	4月30日																																									
収 穫 盛 期	平 年	7月 7日																																									
	前 年	7月 5日																																									
下 旬 (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	400 ℓ																																						
	灰 星 病	ベルコート水和剤	1,000倍(100 g)	収穫3日前までの3回以内																																							
	シンクイムシ類 ハマキムシ類	サムコルフロアブル10	2,500倍(40mℓ)	収穫3日前までの3回以内																																							
ナミハダニ	ダニコングフロアブル	2,000倍(50mℓ)	収穫24時間前までの1回																																								
		海藻サンバ	2,000倍(50 g)	―――																																							
7月	上 旬 (月 日)	灰 星 病	フルーツセイバー	1,500倍(66mℓ)	収穫24時間前までの3回以内	400 ℓ	【黒斑病】② ■枝への感染は、6月から新梢伸長の停止する7月頃まで行われ、発病して夏型枝病斑を形成する。若木など樹勢が旺盛な場合には副梢が多数発生するので8月中旬頃まで感染・発病する。発病している枝は剪除し処分することが大事である。																																				
		シンクイムシ類 アブラムシ類	スカウトフロアブル	2,000倍(50mℓ)	収穫24時間前までの3回以内																																						
	中 旬 (月 日)	灰 星 病	インダーフロアブル	5,000倍(20mℓ)	収穫24時間前までの4回以内	400 ℓ																																					
		シンクイムシ類	ディアナWDG	5,000倍(20 g)	収穫24時間前までの2回以内																																						
	下 旬 (月 日)	灰 星 病	ナリアWDG	2,000倍(50 g)	収穫24時間前までの2回以内	400 ℓ		■ハダニ類の発生が心配な園地ではカネマイトフロアブル 1000倍(収穫3日前までの1回)を使用する。但し収穫前日数には注意する。																																			
		シンクイムシ類 カメムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍(50 g)	収穫24時間前までの3回以内																																						
		海藻サンバ	2,000倍(50 g)	―――																																							
8月	上 旬 (月 日)	灰 星 病	オンリーワンフロアブル	2,000倍(50mℓ)	収穫24時間前までの3回以内	400 ℓ																																					
		シンクイムシ類	テルスターフロアブル	3,000倍(33mℓ)	収穫24時間前までの2回以内																																						
	下 旬 (月 日)	灰星病・黒星病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍(33 g)	収穫24時間前までの2回以内	400 ℓ																																					
		シンクイムシ類 カイガラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍(50 g)	収穫24時間前までの3回以内																																						
			海藻サンバ	2,000倍(50 g)	―――																																						
9月	上 旬 (月 日)	灰 星 病	インダーフロアブル	5,000倍(20mℓ)	収穫24時間前までの4回以内	400 ℓ	■フェニックスフロアブルはコスカシバに対して優れた防除効果がある。8月で収穫を終了した園地ではフェニックスフロアブルのみを散布する。但しこの場合には展着剤を加用する。																																				
		シンクイムシ類 コスカシバ	フェニックスフロアブル	4,000倍(25mℓ)	収穫24時間前までの2回以内																																						
			海藻サンバ	500倍(200 g)	―――																																						
休 眠 期 (黒斑病対策)		―――	展着剤(アビオン-E)	1,000倍(100mℓ)	―――	300 ℓ																																					
黒斑病・ふくろみ病	ムッシュボルドーDF	500倍(200 g)	葉芽発芽前まで																																								

注意 この防除暦は令和3年12月1日現在の日本国での農業登録内容に基づき作成しました。なお、この防除暦に取り上げた農業が、その後登録内容に変更が生じた場合は登録変更内容に準じて使用して下さい。
万一登録内容変更後にお客様の誤使用が問題となった場合には弊社としては一切責任を負いかねます。農業に関する最新の登録内容を確認の上使用して下さい。

注意 防除暦に記載されている農業は気象条件及び散布時間帯により農作物に対し障害を発生させる場合もありますので十分注意して使用して下さい。

注意 防除暦中の農業の使用回数については、薬剤ごとの使用回数を記載しています。同一成分を含む農業の総使用回数については農業のラベル等で確認してから使用して下さい。

注意 適正な農業使用と、適切な防除が行なわれたかを確認するためにも防除記録を記入して下さい。