



みかんの
日焼け軽減で
農薬登録適用拡大!




炭酸カルシウム水和剤
ホワイトコート
WHITE-COAT

ホワイトコートの日焼け軽減について


(農林水産省登録第22852号)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	炭酸カルシウムを含む農薬の総使用回数
みかん	日焼け軽減	25～50倍	200～700L/10a	日焼け果発生前に散布	2回以内	散布	—
かんきつ	チャノキイロアザミウマ			発生初期	—		

<試験データ>



2023年和歌山県果樹試験場
試験品種：ゆら早生
散布日：7月15日、8月16日
果実表面温度計測日：8月16日



2023年山口県農林総合技術センター
試験品種：宮川早生
散布日：7月25日、8月28日
果実表面温度計測日：9月4日



圃場全体 (散布後)



果実写真 (散布後)



収穫時期の果実の様子

■使用上の注意事項

<1> 一般的な注意

- ・ 散布液は使用直前に調整し、均一に分散するよう十分攪拌したのち使用する。
- ・ 散布中も時々攪拌する。
- ・ 収穫間近の散布や散布後の天候により、収穫期まで果実に本剤による白斑が残る可能性があります。
- ・ 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

<2> 本剤を日焼け軽減に使用する場合の注意

- ・ 果実表面に薬剤が十分付着するように散布する。
- ・ 散布間隔は1ヶ月が目安であるが、降雨により効果が劣ることがあるので留意する。

マイナビ農業

Web記事を公開中!!

↓ QRコードから ↓



 白石カルシウム株式会社

食品アグリ資材部 〒104-0031 東京都中央区京橋 1丁目11-1 TEL.03-3538-2354 FAX.03-3535-6514
札幌営業課 〒003-0029 札幌市白石区平和通11北7-23 TEL.011-864-1566 FAX.011-864-1572
大阪営業課 〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-7 TEL.06-6882-3664 FAX.06-6358-6423
熊本営業課 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-21-30 TEL.096-213-8567 FAX.096-383-1881