

月	散布時期	対象病害虫	薬 剤 名	倍数(100 ℓ当り薬量)	安全使用日数と 本剤の使用回数	10a当り 散布量	注 意 事 項																																														
3月	休 眠 期 (下 旬) (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	200 ℓ	■ シャインマスカットは、巨峰に比べて黒とう病に弱く、べと病にはやや弱く、晩腐病に対してはほぼ同等である。																																														
		晩 腐 病 ・ 黒 と う 病	フリントフロアブル25	500倍(200mℓ)	休眠期に1回																																																
4月	発 芽 前 (中 旬) (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	200 ℓ	■ 石灰硫黄合剤にかえてベンレート水和剤 500倍(休眠期処理は1回)を使用しても良い。																																														
		越 冬 病 害 虫	石灰硫黄合剤	20倍(5 ℓ)	発芽前																																																
5月	展 葉 後 (上旬～中旬) (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	200 ℓ	◎樹の生育 山形県農業総合研究センター園芸農業研究所 <table><tr><th colspan="2">時期</th><th>品種</th><th>シャインマスカット</th></tr><tr><td rowspan="2">発 芽 期</td><td>平 年</td><td>前 年</td><td>4 月28日</td></tr><tr><td>前 年</td><td>平 年</td><td>4 月26日</td></tr><tr><td rowspan="2">展 葉 期</td><td>平 年</td><td>前 年</td><td>5 月 2 日</td></tr><tr><td>前 年</td><td>平 年</td><td>5 月 1 日</td></tr><tr><td rowspan="2">開 花 始</td><td>平 年</td><td>前 年</td><td>6 月 7 日</td></tr><tr><td>前 年</td><td>平 年</td><td>6 月 9 日</td></tr><tr><td rowspan="2">満 開 期</td><td>平 年</td><td>前 年</td><td>6 月13日</td></tr><tr><td>前 年</td><td>平 年</td><td>6 月13日</td></tr><tr><td rowspan="2">落 花 期</td><td>平 年</td><td>前 年</td><td>6 月16日</td></tr><tr><td>前 年</td><td>平 年</td><td>6 月16日</td></tr><tr><td rowspan="2">収 穫 盛 期</td><td>平 年</td><td>前 年</td><td>9 月23日</td></tr><tr><td>前 年</td><td>平 年</td><td>9 月17日</td></tr></table> ※シャインマスカットは雨除け被覆下・長梢剪定樹の調査結果 ■ コウモリガ対策としてガットサイドSを幼虫喰入期直前から喰入初期に主幹部に塗布(原液～1.5倍液)または散布(1.5倍液)する。但し収穫21日前までに2回以内で使用する。 ■ 落花直後から袋掛けまでは花粉溶脱の恐れがあるので展着剤は使用しない。また、満開時の散布は着果不良の原因となるので避ける。 ■ ブドウトリバの被害は花蕾や幼果の食害から見られ、以降未熟果にまで食害侵入する被害が続く。 ■ クビアカスカシバの成虫は6～8月にかけて長期に発生する。毎年被害がみられる園地では幼虫発生期の6月下旬にフェニックスフロアブル 4000倍(収穫14日前までの2回以内)を散布する。又、発生の多い園地では7月中旬にも散布する。 ■ クビアカスカシバの幼虫による虫糞排出は7月中旬頃から見られ始めるので、ロビンフッドを樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射処理しても良い。但し、収穫24時間前までの5回以内で使用する。	時期		品種	シャインマスカット	発 芽 期	平 年	前 年	4 月28日	前 年	平 年	4 月26日	展 葉 期	平 年	前 年	5 月 2 日	前 年	平 年	5 月 1 日	開 花 始	平 年	前 年	6 月 7 日	前 年	平 年	6 月 9 日	満 開 期	平 年	前 年	6 月13日	前 年	平 年	6 月13日	落 花 期	平 年	前 年	6 月16日	前 年	平 年	6 月16日	収 穫 盛 期	平 年	前 年	9 月23日	前 年	平 年	9 月17日
		時期		品種	シャインマスカット																																																
		発 芽 期	平 年	前 年	4 月28日																																																
			前 年	平 年	4 月26日																																																
	展 葉 期	平 年	前 年	5 月 2 日																																																	
		前 年	平 年	5 月 1 日																																																	
	開 花 始	平 年	前 年	6 月 7 日																																																	
		前 年	平 年	6 月 9 日																																																	
	満 開 期	平 年	前 年	6 月13日																																																	
		前 年	平 年	6 月13日																																																	
落 花 期	平 年	前 年	6 月16日																																																		
	前 年	平 年	6 月16日																																																		
収 穫 盛 期	平 年	前 年	9 月23日																																																		
	前 年	平 年	9 月17日																																																		
下 旬 (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	250 ℓ																																																
	晩腐病・黒とう病・べと病 褐斑病	ジマンダイセン水和剤	1,000倍(100 g)	収穫45日前までの2回以内																																																	
	べと病・晩腐病・黒とう病 褐斑病	ホライズンドライブフロアブル	2,500倍(40 g)	収穫21日前までの3回以内																																																	
	コナカイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	ダントツ水溶剤	2,000倍(50 g)	収穫24時間前までの3回以内																																																	
		海藻サンバ	2,000倍(50 g)	―――																																																	
6月	開 花 前 (上 旬) (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)	―――	250 ℓ																																															
		灰 色 か び 病 ・ 晩 腐 病	スイッチ顆粒水和剤	2,000倍(50 g)	収穫30日前までの2回以内																																																
		べ と 病	レーバスフロアブル	2,000倍(50mℓ)	収穫7日前までの3回以内																																																
		ハダニ類 ブドウサビダニ	マイトコーネフロアブル	1,000倍(100mℓ)	収穫21日前までの1回																																																
	落 花 直 後 (中 旬) (月 日)		液体マグリキ(水溶性苦土12%)	500倍(200mℓ)	―――	250 ℓ																																															
			海藻サンバ	2,000倍(50 g)	―――																																																
		晩腐病・黒とう病・さび病 灰色かび病	ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍(33 g)	収穫14日前までの3回以内																																																
		アザミウマ類 フタテンヒメヨコバイ カイガラムシ類 コガネムシ類成虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍(50 g)	収穫14日前までの3回以内																																																
	幼 果 期 (上 旬) (月 日)		液体マグリキ(水溶性苦土12%)	500倍(200mℓ)	―――	250 ℓ																																															
			海藻サンバ	2,000倍(50 g)	―――																																																
		晩腐病・黒とう病・さび病 褐斑病・灰色かび病	フルーツセイバー	1,500倍(66mℓ)	収穫7日前までの3回以内																																																
		べ と 病	ライメイフロアブル	3,000倍(33mℓ)	収穫14日前までの3回以内																																																
袋 か け 前 (中 旬) (月 日)	ハ マ キ ム シ 類 ア ザ ミ ウ マ 類	ディアナWDG	1万倍(10 g)	収穫24時間前までの2回以内	250 ℓ																																																
		液体マグリキ(水溶性苦土12%)	500倍(200mℓ)	―――																																																	
	晩腐病・黒とう病・さび病 褐斑病・灰色かび病	オンリーワンフロアブル	2,000倍(50mℓ)	収穫24時間前までの3回以内																																																	
	コガネムシ類・コナカイガラムシ類 カメムシ類・フタテンヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	ダントツ水溶剤	2,000倍(50 g)	収穫24時間前までの3回以内																																																	
袋 かけ 直 後 (上 旬) (月 日)	ハ ダ ニ 類	スターマイトフロアブル	2,000倍(50mℓ)	収穫14日前までの1回	250 ℓ																																																
		海藻サンバ	2,000倍(50 g)	―――																																																	
	8月	袋 かけ 直 後 (上 旬) (月 日)	―――	展着剤(アイヤーエース)		1万倍(10mℓ)	―――	250 ℓ																																													
			晩腐病・黒とう病・さび病 褐斑病・灰色かび病	オンリーワンフロアブル		2,000倍(50mℓ)	収穫24時間前までの3回以内																																														
べ と 病			ランマンフロアブル	1,000倍(100mℓ)	収穫14日前までの3回以内																																																
コガネムシ類・カメムシ類 ゲムシ類・クビアカスカシバ チャノキイロアザミウマ			テッパン液剤	2,000倍(50mℓ)	収穫24時間前までの2回以内																																																
		液体マグリキ(水溶性苦土12%)	500倍(200mℓ)	―――	250 ℓ																																																
		ツートップ48(亜リン酸入り肥料)	1,000倍(100mℓ)	―――																																																	
中 旬 ～ 下 旬 (月 日)		―――	展着剤(アイヤーエース)	1万倍(10mℓ)		―――	250 ℓ																																														
		べ と 病 ・ さ び 病	コサイド3000	2,000倍(50 g)		―――																																															
	―――	クレフノン	100倍(1 kg)	―――																																																	
		液体マグリキ(水溶性苦土12%)	500倍(200mℓ)	―――																																																	
9月	収 穫 後 (下 旬) (月 日)	―――	展着剤(アビオン-E)	1,000倍(100mℓ)	―――	300 ℓ																																															
		べ と 病 ・ さ び 病	コサイド3000	2,000倍(50 g)	―――																																																
		ブドウトラカミキリ	スミチオン水和剤40	1,000倍(100 g)	収穫21日前までの2回以内																																																
		―――	クレフノン	100倍(1 kg)	―――																																																
	休 眠 期 (月 日)	ブドウトラカミキリ	トラサイドA乳剤	300倍(333mℓ)	発芽前(休眠期)に2回以内	200 ℓ	(注) MEPを含む農薬の総使用回数は4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内)である。																																														

注意 この防除暦は令和3年12月1日現在の日本国での農薬登録内容に基づき作成しました。なお、この防除暦に取り上げた農薬が、その後登録内容に変更が生じた場合は登録変更内容に準じて使用して下さい。万一登録内容変更後にお客様の誤使用が問題となった場合には弊社としては一切責任を負いかねます。農薬に関する最新の登録内容を確認の上使用して下さい。

注意 防除暦に記載されている農薬は気象条件及び散布時間帯により農作物に対し障害を発生させる場合もありますので十分注意して使用して下さい。

注意 防除暦中の農薬の使用回数については、薬剤ごとの使用回数を記載しています。同一成分を含む農薬の総使用回数については農薬のラベル等で確認してから使用して下さい。

注意 適正な農薬使用と、適切な防除が行なわれたかを確認するためにも防除記録を記入して下さい。