

アグロだより 6月号

令和4年5月25日発行

イノチオプラントケア(株)

福島営業課

伊達市保原町上保原字観音前1-1
TEL:024(575)5622
FAX:024(575)4704

毎日の農作業お疲れ様です

6月の天気予報は下記の予想です。梅雨時期の農薬散布は10日以上空けないように早め早めをお願いします。
農事気象予測(6月)空梅雨傾向ではあるが、天候不安定な時あるやも。下旬頃から局地的な大雨・洪水に注意。
今年の夏はラニーニャ現象が続く可能性が高く、6月は梅雨入り早々大雨に警戒、7月は早い梅雨明けか酷暑に、8月はゲリラ豪雨に注意、暑さは続く予報です。



もも

◎雨天、曇天も予想されます。
定期散布は10日ごと、降雨が予想される場合には雨前散布を実施しましょう。

【6月10日頃】

・展着剤 ・チオノックフロアブル 500倍(7日前/5回)	・スーパーグロス 1,000倍 又は ・アミクロ 500~1,000倍	←	・アビオンE 1,000倍 ・マイコシールド 2,000倍 (21日前/5回)	左記に使用する。
----------------------------------	---	---	---	----------

【6月20日頃】

・展着剤 ・チオノックフロアブル 500倍(7日前/5回) ・ディアナWDG 10,000倍(前日/2回)	・ツートップ48 1,000倍 (亜リン酸) 又は ・サンカラー 1,000倍 (亜リン酸) ・マグリキ 1,000倍	←	・アビオンE 1,000倍 ・スターナ(水) 1,000倍 (7日前/3回)	左記に使用する。
---	--	---	--	----------

【6月30日頃】

・展着剤 ・ダコレート(水) 1,000倍(3日前/3回) ・アルバリン顆粒(水) 2,000倍(前日/3回)	・コクー番 1,000倍 又は ・ピタリG1 1,000倍	←	・アビオンE 1,000倍 ・デランフロアブル 600倍 (7日前/4回)	左記に使用する
---	-------------------------------------	---	---	---------

◎着色・糖度促進【6月20~30日頃】(収穫30日前) ・カルゲン粉剤(15kg) 3袋/10a

りんご

◎褐斑病・輪紋病・炭そ病の重要防除時期です。
十分な薬量で10日間隔の雨前散布を心がけましょう。

【6月15日頃】

・展着剤 ・ナリアWDG 2,000倍(前日/3回) ・ダズバンDF 3,000倍(45日前/1回) ・ダニコングフロアブル 2,000倍(前日/1回)	・ネオカル 1,000倍 (カルシウム)
---	-------------------------

【6月25日頃】

・アビオンE 1,000倍 ・ユニックス顆粒(水) 2,000倍(14日前/4回) ・オキシラン(水) 500倍(14日前/4回) ・ダントツ水溶剤 2,000倍(前日/3回)	・ネオカル 1,000倍 (カルシウム)
---	-------------------------

*ユニックスは、おうとうに飛散(薬害)しないように 注意。

【7月5日頃】

・アビオンE 1,000倍 ・オキシラン(水) 500倍(14日前/4回) ・トップジンM(水) 1,500倍(前日/6回) ・サイアノックス(水) 1,000倍(14日前/1回)	・ネオカル 1,000倍 (カルシウム)
---	-------------------------

●ダニ予防に

・ピラニカ(水) 1,000倍(14日前/1回) を使用しても良い。

おうとう

◎特に湿度が高い時は、灰星病・ショウジョウバエにも注意しましょう

(注)展着剤・乳剤は、使用しないで下さい。

【6月10日頃】(中・晩生種)	・スコア顆粒 2,000倍 (前日/3回)	・海藻サンバ 500倍
・エクシレルSE 2,500倍 (前日/3回)	・ツートップ48 1,000倍 又は・サンカラー 1,000倍 ・マグリキ 1,000倍 (苦土)	

*裂果軽減として、グリーンステム(アミノ酸)を500g/10aの割合で使用。
(葉面散布・薬剤散布同時使用でよい。汚れはない。)

【6月中旬】(晩生種)

・ナリアWDG 2,000倍 (前日/3回)	・ファイン 1,000倍 (腐植酸)
・ダントツ(水) 2,000倍 (前日/2回)	・海藻サンバ 500倍 (葉面散布肥料)

【6月下旬~7月上旬】

・アミスター10F 1,000倍 (前日/3回)	・ファイン 1,000倍 (腐植酸)
・アルバリン顆粒(水) 2,000倍 (前日/2回)	・花果神L 15,000倍 (プロリン)