

ホタルイは
年々ガンコになる。
では、除草剤はどうだ？

今までにない カヤツリ剤



地上部だけでなく
地下部も…



※画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

新成分「ベルダー」配合！
あの「銀河」がパワーアップして戻ってきた。

- 除草成分「アルテア」配合。多年生雑草の塊茎形成も減らします。
- 新成分「ベルダー」配合。ホタルイなどカヤツリグサ科雑草に卓効！
- オモダカ、コナギなどSU抵抗性雑草への効果も強化しています。

※ベルダー®はジメスルファゼットの愛称です。 ※アルテア®はメタゾスルフロン®の愛称です。 ®は登録商標

水稲用 一発処理除草剤

銀河[®] アルファ

1キロ粒剤/フロアブル/ジャンボ®/エアー粒剤



	登録番号	有効成分			容量
		ジメスルファゼット	ピラクロニル	メタゾスルフロン	
1キロ粒剤	第24890号	1.5%	2.0%	1.0%	1kg, 5kg, 20kg
フロアブル	第24893号	3.0%	4.0%	2.0%	500ml, 5ℓ
ジャンボ	第24891号	3.75%	5.0%	2.5%	400g, 8kg
エアー粒剤	第24892号	3.75%	5.0%	2.5%	2kg

水稲用除草剤「銀河」の多年生雑草・抵抗性広葉雑草への効果はそのままに、年々ガンコになるホタルイへの効果を強化した、「パワーアップした銀河」!


- 今までにないカヤツリ剤「ベルダー」配合! 年々ガンコになるホタルイに卓効です。
- 除草成分「アルテア」を配合。多年生雑草の塊茎も減らし、翌年の発生量を減らします。
- 一年生広葉雑草に定評の成分「ピラクロニル」も配合しています。

今までにない カヤツリ剤

ベルダー配合




ベルダーが、年々ガンコになるSU抵抗性ホタルイに卓効を示します。



試験場所: 埼玉県白岡市 日産化学生物科学研究所温室内 ベルダー薬量: 15g a.i./10a
薬剤処理日: 2022年8月17日 対象雑草: SU抵抗性イヌホタルイ生育初期

アルテアが、多年生雑草の地上部だけでなく塊茎も減らします。

クログワイは土中深い所まで広範囲で塊茎をつくります。この写真は、10~20cm深での塊茎形成の調査結果を示したものです。



アルテアが塊茎も減らす!

2012年 日産化学圃場試験(栃木県宇都宮市)
試験規模: 5㎡ 6/14処理、10/2採掘、1㎡×30cm深

適用雑草と使用方法

※1:フロアブルを除く ※2:1キロ粒剤のみ ※3:本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

作物名	適用雑草	使用時期	剤型 使用量	総使用回数 ^{※3}	使用方法
移植 水稲	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ ウリカワ、ミスガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ、オモダカ クログワイ コウキヤガラ ^{※1}	移植時	1キロ粒剤 1kg/10a	本剤 1回	田植同時散布機で施用
		移植直後~ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで			湛水散布又は 無人航空機による散布
		移植後3日~ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	ジメスルファゼット剤 2回以内		水田に小包装(パック)の まま投げ入れる
直播 水稲	一年生雑草 及び マツバイ ^{※2} ホタルイ ウリカワ ミスガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1葉期~ノビエ3葉期 ただし、 収穫90日前まで	1キロ粒剤 1kg/10a	ピラクロニル剤 2回以内	湛水散布又は 無人航空機による散布
			ジャンボ 小包装(パック)10個 (400g)/10a		メタゾスルフロン剤 2回以内
			エアー粒剤 400g/10a		湛水散布又は 無人航空機による散布
			フロアブル 500ml/10a		原液湛水散布又は 無人航空機による滴下

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2025年7月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)