

だいでず
登録拡大



プロフレア[®] SC

BROFREYA

※プロフレア、テネベナルは三井化学クロップ&ライフソリューション（株）の登録商標



殺虫剤 **チョウ目・ハムシ専門剤**

■ 適用害虫と使用方法(適用表から一部抜粋) 2024年9月18日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロフラニドを含む農薬の総使用回数
だいでず	ハスモンヨトウ オオタバコガ ダイズサヤタマハエ フタスジヒメハムシ	2000~ 4000倍	100~ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
		16~32倍	0.8~1.6L /10a			無人航空機 による散布	

その他適用作物：キャベツ、はくさい、だいこん、かぶ、はなやさい類、非結球あぶらな科葉菜類、レタス、非結球レタス、ねぎ、えだまめ、かんしょ、きく等



抵抗性害虫にも有効

既存剤に抵抗性を獲得した害虫にも効果を示します。

速効的に効く

数時間で作用を発現し、速やかな殺虫効果を示します。

3週間の残効性

薬剤は葉面上で3週間程度の効果を示します。

雨にも強い

突然の雨があっても、効果の持続性に変わりはありません。

無人航空機による散布が可能



特長



■ 適用害虫と使用方法(適用表から一部抜粋)

2024年9月18日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロフラニドを含む農薬の総使用回数
だいず	ハスモンヨトウ オオタバコガ ダイズサヤマバエ フタスジヒメハムシ	2000~4000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
		16~32倍	0.8~1.6L/10a			無人航空機による散布	

その他適用作物：キャベツ、はくさい、だいこん、かぶ、はなやさい類、非結球あぶらな科葉菜類、レタス、非結球レタス、ねぎ、えだまめ、かんしょ、きく等

○使用前にはラベルをよく読んでください。 ○本剤は小児の手の届く所に置かないでください。
○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

※本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載内容以外には、使用しないでください
※本印刷物は2024年9月現在の資料、情報、データ等に基づいて作成しています。

