

アグロだより 5月号

令和5年4月25日発行

イノチオプラントケア(株)

福島営業課

伊達市保原町上保原字観音前1-1

TEL:024(575)5622

FAX:024(575)4704



毎日の農作業お疲れ様です。

農事気象予測(5月)降水量少なく、田植え時水不足あるやも。時に寒気入りて、落雷・突風・降雹に注意。

仙台管区気象台 向こう1か月天気の見通し(4/29~5/28)

期間の前半を中心に暖かい空気が流れやすいため、向こう1か月の気温は高く、特に、期間の前半はかなり高くなる見込みです。5月の天気は数日周期で変わりますので、定期防除は早めをお願いします。

なお、散布日は平年を基準に記載しておりますので、各作物の満開日を基準に設定願います。

もも

「あかつき」の満開は4月5日で平年より14日早く、昨年より8日早くなりました。(果樹研究所)

◎モモハモグリガが発生しています。薬剤散布を徹底しましょう！

【5月18日頃】

≪葉面散布剤≫

・展着剤		・アミクロ	500倍
・イオウフロアブル (黒星病)	500倍(一/一)		
・アクタラ顆粒(水) (アブラムシ・モモハモグリガ・シンクイムシ)	2,000倍(前日/3回)		

【穿孔細菌病地域】

・アビオンE	1,000倍	左記に使用する。
・マイコシールド (21日前/5回)	2,000倍	

【5月30日頃】

・展着剤		・アミクロ	500~1,000倍
・デランフロアブル (黒星・灰星病)	600倍(7日前日/4回)		
・エクシレルSE (モモハモグリガ・シンクイムシ・ハマキムシ)	2,500倍(前日/3回)		
・アプロードフロアブル (カイガラムシ類幼虫)	1,000倍(14日前/3回)		

・アビオンE	1,000倍	左記に使用する。
・スターナ(水) (7日前/3回)	1,000倍	

【6月10日頃】

・展着剤		・アミクロ	500~1,000倍
・チオノックフロアブル (せん孔病・黒星・灰星病)	500倍(7日前/5回)		
・ダントツ水溶剤 (シンクイムシ類・モモハモグリガ・アブラムシ類・カイガラムシ類・カメムシ類)	2,000倍(7日前/3回)		

・アビオンE	1,000倍	左記に使用する。
・マイコシールド (21日前/5回)	2,000倍	

【6月20日頃】

・展着剤		・サンカラー(亜リン酸)	1,000倍
・チオノックフロアブル (せん孔病・黒星・灰星病)	500倍(7日前/5回)	・マグリキ(苦土)	1,000倍
・ディアナWDG (シンクイムシ類・ハマキ・モモハモグリガ)	10,000倍(前日/2回)		
・カネマイトフロアブル (ハダニ類)	1,000倍(7日前/1回)		

・アビオンE	1,000倍	左記に使用する。
・スターナ(水) (7日前/3回)	1,000倍	

りんご

「ふじ」の満開は4月14日で平年より16日早く、昨年より11日早くなりました。(果樹研究所)

◎斑落・うどんこ・アブラムシに注意しましょう！

【5月20日頃】

・展着剤		・ニツソラン(水)	2,000倍(7日前/2回)	・アミクロ	500倍
・オーシャイン(水)	2,000倍(7日前/5回)	(昨年ダニ発生があった場合)		・クレミクスネオ	333倍
・ロディー(水)	1,000倍(前日/2回)			(カルシウムと有機被膜補助剤)	

【6月5日頃】

・展着剤		・ネオカル	1,000倍
・アントラコール顆粒(水)	500倍(45日前/4回)	(カルシウム)	
・トランスフォームフロアブル	2,000倍(前日/3回)		

【6月15日頃】

・展着剤		・ダイアジノン(水)	1,000倍(30日前/4回)	・ネオカル	1,000倍
・ナリアWDG	2,000倍(前日/3回)	・ダニコングフロアブル	2,000倍(前日/1回)	(カルシウム)	

【6月25日頃】

・アビオンE	1,000倍	・ネオカル	1,000倍
・ユニックス(顆粒水)	2,000倍(14日前/4回)	(カルシウム)	
・オキシラン(水)	500倍(14日前/4回)		
・ダントツ(水溶)	2,000倍(前日/3回)		