

アグロだより 8月号

令和4年7月25日発行

イノチオプラントケア(株)

福島営業課

伊達市保原町上保原字観音前1-1

TEL:024(575)5622

FAX:024(575)4704



毎日の農作業お疲れ様です。
いよいよ各品種の収穫時期となりますが、収穫までしっかりと病害虫防除と着色管理に努めてください。
また、1ヶ月予報では、日照時間は平年並みか多い見込み、平均気温は高い見込みです。
ダニの発生に注意してください。

もも

◎特に晩生種の灰星・**フォモプシス腐敗病**に注意し、除袋後の防除を徹底しましょう。
除袋後の防除は、1日ぐらいいおいてから散布しましょう。

【8月5～10日頃】

- ・展着剤
- ・オンリーワンフロアブル 2,000倍 (前日/3回)
- ・ディアナWDG 10,000倍 (前日/2回)

《葉面散布剤》

- ・ファイン 1,000倍

【8月20日頃】

- ・展着剤
- ・ナリアWDG 2,000倍 (前日/2回)
- ・ダイアジノン(水) 1,000倍 (前日/4回)

- ・ファイン 1,000倍
- 又は
- ・海藻サンバ 1,000倍

【8月下旬～9月上旬】

- ・展着剤
- ・ベルコート(水) 1,000倍 (前日/3回)
- ・バリアード顆粒(水) 2,000倍 (前日/3回)



《穿孔細菌病秋期防除》

【収穫後】

- ・アビオンE 1,000倍
 - ・チオノックフロアブル 500倍 (7日前/5回)
(穿孔病)
 - ・ダーズバンDF 3,000倍 (14日前/5回)
(カイガラムシ)
 - ・グリーントップ 500倍 (樹勢回復)
- 収穫中の品種に飛散させない。**

【9月15日頃】

- ・アビオンE 1,000倍
- ・Zボルドー(水) 500倍 (収穫後～)
- ・クレフノン 100倍 (開花前まで)

☆又は、4-12式ボルドー液

【お礼肥】(各品種収穫後)

すばやく効き目!!

・**ニトランタ**(20kg) 1袋/10a

・硝酸性チツソ14% ・水溶性カルシウム26～28%



***チツソとカルシウムが同時にすばやく吸収され樹勢回復!!**

【9月25日頃】

- ・アビオンE 1,000倍
- ・Zボルドー(水) 500倍 (収穫後～)
- ・クレフノン 100倍 (開花前まで)

☆又は、4-12式ボルドー液

(注)高温時、散布直後の降雨・軟弱葉には、
葉害の恐れがありますので、注意しましょう!!

●**次年度の貯蔵養分蓄積に葉面散布肥料
・スーパーグロス 1,000倍を使用する。**

りんご

◎**褐斑病・輪紋・斑落・炭そ・ダニ**に注意しましょう。

【8月5日頃】

- ・ベルコート(水) 1,000倍 (前日/6回)
- ・トップジンM(水) 1,500倍 (前日/6回)
- ・ロディー(水) 1,000倍 (前日/2回)

《葉面散布剤》

- ・カルアップ 1,000倍



【8月20日頃】

- ・パレード15フロアブル 2,000倍 (前日/2回)
- ・ユニックス顆粒(水) 2,000倍 (14日前/4回)
- ・モスピラン顆粒(水) 2,000倍 (前日/3回)

- ・コクー番 1,000倍
- 又は
- ・ピタリG1 1,000倍

【特別散布】ダニ発生時

- ・アイヤーエース 10,000倍
- 又は ラビデン3S
- ・コロマイト(乳) 1,000倍 (前日/1回)

【9月5日頃】

- ・ダイパワー(水) 1,000倍 (前日/6回)
- ・スカウトフロアブル 2,000倍 (前日/5回)

- ・コクー番 1,000倍
- 又は
- ・ピタリG1 1,000倍

【収穫50日～45日頃】

●**ふじ・王林の着色・糖度促進に!**

●**カルゲン粉剤(15kg) 3袋/10a**

●**芯腐れ・ビタービットにも効果があります。
(カルシウム不足による生理障害。)**

●**収穫前・収穫中の桃の隣接園は、ダイパワーにかえて
・ナリアWDG 2,000倍(前日/3回)を使用する。**

