

なし

◎収穫まで**黒星病**に注意すると共に、
輪紋・黒斑病・ダニにも注意しましょう。

【特別散布】ダニ発生時 ・コロマイト(水) 2,000倍 (前日/1回)
(8月12日頃)

【8月20日頃】 収穫直前

・フルーツセイバー 1,500倍 (前日/3回)
・ロディー(水) 1,000倍 (前日/2回)

《葉面散布剤》

・ピタリG1 1,000倍
(ミネラル)
・樹勢顆粒 3,000倍
(クロレラ)

【9月1日頃】

・ストロビーDF 2,000倍 (前日/3回)
・スカウトF 2,000倍 (前日/5回)
(シンクイ・アブラムシ・カメムシ)

・ピタリG1 1,000倍
(ミネラル)
・樹勢顆粒 3,000倍
(クロレラ)

★落果防止剤 ; **ストップール液剤**(青梨:2,000倍 赤梨:2,500倍)
収穫14日~7日前/1回

***他剤との混用は避け、展着剤は使用しない。**

ぶどう

◎さび・べと病に注意し、着色に努力しましょう。

【8月5日頃】

・ラビデン3S 10,000倍
・レーバスフロアブル 2,000倍 (7日前/3回)
・ディアナWDG 10,000倍 (前日/2回)

《葉面散布剤》

・マグリキ(苦土) 1,000倍
・ツートップ48 1,000倍
(亜リン酸)

【8月15日頃】

・ラビデン3S 10,000倍
・カナメフロアブル 4,000倍 (前日/3回)
・ダントツ水溶 2,000倍 (前日/3回)

・コクー番 1,000倍
又は
・ピタリG1 1,000倍

【9月上旬】

・アビオンE 1,000倍
・Zポルドー(水) 500倍 (一/一)
・クレフノン 100倍



おうとう

◎収穫後の穿孔病・炭そ病の防除を徹底し、
礼肥も施用しましょう。

【8月上旬~中旬】

・アビオンE 1,000倍
・オキシラン(水) 600倍
(収穫終了後~落葉期/3回) ***オキシラン(水)は桃へ飛散しないように注意する。**
・アプロードF 1,000倍 (7日前/2回)

《葉面散布剤》

・アミクロ 1,000倍
(葉面散布肥料)

【8月下旬】

・アビオンE 1,000倍
・オキシラン(水) 600倍
(収穫終了後~落葉期/3回)

・グリーントップ 500倍
(苦土葉面散布肥料)

礼 収穫後に施用する。

肥 ・ニトランダ 1袋
・硫酸マグネシウム 1袋

《イノチオプラントケアからのお知らせ》

◎肥料注文書配布

8月より配布となります。

◎お客様の畑の健康診断してみませんか？

土壌診断

1点; ¥3,300.

土の量; 茶碗一杯くらい

採取方法; 1圃場、地表から10cmの所を
五か所から採取し、混和する。



◎お盆休み

8月11~16日まで。

《イノチオプラントケアおすすめ肥料》

◎果樹の礼肥に！

ニトランダ 20kg

・おすすめポイント

ニトランダは、水に非常に良く溶け、速やかに肥効を発揮し、早害時にも確実な肥効があらわれます。硝酸性チッソ14% 水溶性カルシウム26~28%で苦土や微量元素も含んでいますので、お礼肥におすすめです。

10アール当たり1袋



◎リンゴの食味向上に！

カルゲン 15kg

・おすすめポイント

カルシウムの吸収効果により着色促進、糖度、食味向上およびビターピット等の軽減が期待できます。

収穫50~45日前 10アール当たり3袋

