

# アグロだより 7月号

令和4年6月25日発行

イノチオプラントケア(株)

福島営業課

伊達市保原町上保原字観音前1-1

TEL:024(575)5622

FAX:024(575)4704



毎日の農作業お疲れ様です。  
雨期はすべての作物の病虫害防除の重点防除時期になります。  
病害においては、降雨が続くと二次感染により発病が増加するおそれがあり、虫害でも各種の世代発生時期に散布を逃すと被害拡大につながります。引き続き注意しましょう。

## もも

◎穿孔細菌病、灰星・フオモプシス腐敗病・モモハモグリガにも注意しましょう。

### 【7月10日頃】

- ・展着剤
  - ・ベルコート(水) 1,000倍 (前日/3回)
  - ・ロディー(乳) 1,000倍 (前日/5回)
- (シンクイ虫類・モモハモグリガ・アブラムシ類)

### 《葉面散布剤》

- ・コクー番 1,000倍 (葉面散布肥料)
- 又は ・海藻サンバ 1,000倍
- 又は ・ピタリG1 1,000倍
- ・ファイン 1,000倍 (腐植酸)

### 《せん孔細菌病》

- \*ベルコート(水)をかえて
  - ・アビオンE 1,000倍
  - ・バリダシン(液) 500倍
- (7日前/5回) ←7日前までなので、注意!!**

### 【7月20日頃】

- ・展着剤
  - ・アクサーフロアブル 2,000倍 (前日/3回)
  - ・モスピラン顆粒(水) 2,000倍 (前日/3回)
- (シンクイ虫類・モモハモグリガ・アブラムシ類)

- ・コクー番 1,000倍 (葉面散布肥料)
- 又は ・サンカラー 1,000倍
- 又は ・ピタリG1 1,000倍
- ・ファイン 1,000倍 (腐植酸)

## ぶどう

◎べと・晩腐病に十分注意しましょう。

### 【7月5日頃】

- ・ホライズンDF 2,500倍 (21日前/3回)

### 《葉面散布剤》

- ・マグリキ(苦土) 1,000倍

### 【7月30日頃】

- ・展着剤
- ・ファンタジスタ顆粒(水) 3,000倍 (前日/3回)
- (灰星・ホモプシス)
- ・テルスターフロアブル 3,000倍 (前日/2回)

- ・コクー番 1,000倍 (葉面散布肥料)
- 又は ・海藻サンバ 1,000倍
- 又は ・ピタリG1 1,000倍
- ・ファイン(腐植酸) 1,000倍

### 【7月15日頃】

- ・ラビデン3S 10,000倍
- ・オンリーワンフロアブル 2,000倍 (前日/3回)
- ・ランマンフロアブル 1,000倍 (14日前/3回)
- ・アーデントフロアブル 2,000倍 (前日/4回)

- ・マグリキ(苦土) 2,000倍



### 【8月5~10日頃】

- ・展着剤
- ・オンリーワンF 2,000倍 (前日/3回)
- (灰星・ホモプシス)
- ・ディアナWDG 10,000倍 (前日/2回)

- ・ファイン 1,000倍 (腐植酸)

### 【特別散布】ダニ発生時

- ・ラビデン3S 10,000倍
- ・コロマイト(水) 2,000倍 (7日前/2回)

## りんご

◎斑落・輪紋・褐斑・炭そ病・シンクイ・ダニに注意しましょう。

### 【7月15日頃】

- ・アビオンE 1,000倍
  - ・ベフキン(水) 1,000倍 (14日前/3回)
  - ・アルバリン顆粒 2,000倍 (前日/3回)
- (シンクイ・キンモン・ギンモン)

### 《葉面散布剤》

- ・ネオカル 1,000倍 (カルシウム)

**\*高温時の散布はさける。(薬害)**

### 【7月25日頃】

- ・アビオンE 1,000倍
  - ・ファンタジスタ顆粒 3,000倍 (前日/3回)
  - ・テツパン(液) 2,000倍 (前日/2回)
- (キンモン・ハマキ・シンクイ・カメムシ)
- ・マイトコーネF 1,000倍 (前日/1回)

- ・ネオカル 1,000倍 (カルシウム)

### 【8月5日頃】

- ・展着剤
- ・ベルコート(水) 1,000倍 (前日/6回)
- ・トップジンM(水) 1,500倍 (前日/6回)
- ・ロディー(水) 1,000倍 (前日/2回)

- ・カルアップ 1,000倍 (カルシウム)



## おうとう

### 【7月中~下旬】(収穫後)

- ・アビオンE 1,000倍
- ・キャプレート(水) 800倍 (14日前/2回)
- ・サイアノックス(水) 1,000倍 (14日前/2回)
- ・カネマイトF 1,000倍 (7日/1回)

### 《葉面散布剤》

- ・アミクロ 1,000倍 (葉面散布肥料)

## かき

◎落葉病・カイガラ・アザミウマに注意しましょう。

### 【7月上旬】

- ・アビオンE 1,000倍
- ・ベルコート(水) 1,000倍 (14日前/3回)
- ・アクタラ顆粒(水) 2,000倍 (3日前/3回)

### 《葉面散布剤》

- ・カルアップ 1,000倍 (カルシウム)

### 【7月15~20日頃】

- ・アビオンE 1,000倍
- ・キノドー顆粒 1,000倍 (14日前/5回)

- ・カルアップ 1,000倍 (カルシウム)

**\*ももの隣接園は、  
トップジンM(水)  
1,000倍 (前日/6回)**

**追肥(7月中旬~下旬)  
・アミノ有機特30号**

- ・ダイアジノン(水) 1,000倍 (45日前/4回)

**(1袋/10a)**