



アゴだより 9月号

令和4年8月25日発行

毎日の農作業お疲れ様です。

本年は、猛暑の中、管理・収穫と大変ご苦労様でした。

また、ここ数年異常気象が続いておりますので、これからの収穫予定作物は、引き続き注意を、収穫を終えたものは、次年度の為に「礼肥」「元肥」を充分施肥しましょう！

イノチオプラントケア(株)

福島営業所

伊達市保原町上保原字観音前1-1

TEL024(575)5622

FAX024(575)4704

もも

◎次年度のために収穫後の防除を徹底すると共に、樹勢の低下もありますので元肥も少し早めに施用しましょう。

《穿孔細菌病防除》

【収穫直後】

・アビオンE	1,000倍
・チオノックF	500倍 (7日前/5回)
・ダースバンDF	3,000倍 (14日前/5回)

《葉面散布剤》

(次年度貯蔵養分補給)

・スーパーグロス	1,000倍
(葉面散布肥料)	

《礼肥》

・ニランダ(20kg)	1袋/10a
-------------	--------

《元肥》

【9月下旬～】

・フルーツ有機ペレット(20kg)	5袋/10a
-------------------	--------

(N-12・P-8・K-5)

又は、

・アミノ酸入有機特30号(20kg)	5袋/10a
--------------------	--------

(N-10・P-10・K-10)

又は

・旬の素(20kg)	7袋/10a
------------	--------

(N-5・P-7・K-3)

《コスカシバ防除》

【9月下旬～10月中旬】 休眠期

・プラテン80	2,000倍
・トラサイドA乳剤	200倍 (収穫後～発芽前)

枝幹部への散布(手散布)

※トラサイドA乳剤は葉に薬剤がかかると薬害を生じるので注意

※収穫中及び隣接園注意

【9月中旬頃】

・アビオンE	1,000倍
・Zボルドー水	500倍

(収穫後～開花前まで)

(カイガラ虫対策)

・クレフノン	100倍
--------	------

・スーパーグロス	1,000倍
(葉面散布肥料)	

【9月下旬頃】

・アビオンE	1,000倍
・Zボルドー水	500倍

(収穫後～開花前まで)

・クレフノン	100倍
--------	------

【落葉直後】

・アビオンE	1,000倍
・Zボルドー水	500倍

りんご

◎褐斑病・輪紋・炭そ・ハマキムシ・ナミハダニに注意しましょう。

【9月5日頃】

ダイパワー(水)	1,000倍 (前日/6回)
スカウトフロアブル	2,000倍 (前日/5回)

《葉面散布剤》

(着色・糖度促進として)

・コクー番	1,000倍
(葉面散布肥料)	

又は

・ピタリG1	1,000倍
--------	--------

【収穫50日～45日頃】

●ふじ・王林の着色・糖度促進に！

・カルゲン粉剤(15kg)	3袋/10a
---------------	--------

*芯腐れ・ビターピットにも効果があります。

《礼肥》(早生種)

・アミノ酸有機特30号(20kg)	1袋/10a
(N-10・P-10・K-10)	

《元肥》

・スーパーリンリン(20kg)	2袋/10a
-----------------	--------

(有機リン酸肥料)(N-2・P-15・K-2・Mg-2)

・旬の素(20kg)	5袋/10a
------------	--------

又は

・フルーツ有機ペレット(20kg)	3袋/10a
-------------------	--------

【9月中旬頃】

・オーソサイド(水)	600倍 (前日/6回)
・フェニックスフロアブル	4,000倍 (前日/2回)

・ツートップ48	1,000倍
----------	--------

・マグリキ	1,000倍
-------	--------

特別散布

【9月下旬】

・ストライド顆粒(水)	1,500倍
(開花から収穫前日/3回)	
・ディアナWDG	10,000倍 (前日/2回)

《葉面散布剤》

・ツートップ48	1,000倍
----------	--------



《落果防止》

・ストップール液	1,000倍
----------	--------

●収穫開始予定日の25日前～7日前/2回

●2回散布の場合は、10日程間隔をあげる。

●単用散布とし展着剤は使用しない。